



Australian Government



6 aylık ile 4 yaş arasındaki bazı çocuklar için COVID-19 aşılama önerisi

18 Ocak 2023

Avustralya'nın aşılama uzmanları olan Australian Technical Advisory Group on Immunisation, bağışıklığı ileri derecede baskılanmış, engelli ve COVID-19'u ağır geçirme riskini artıran karmaşık ve/veya çoklu sağlık sorunu olan 6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocukların COVID-19 aşısı olmalarını öneriyor.

Bu öneriye aşağıdaki veya benzer sorunları olan çocuklar dahildir:

- Halihazırda kanser veya bağışıklık bastırma tedavisi alanlar dahil ileri derecede birincil veya ikincil bağışıklık yetmezliği olanlar;
- Kemik iliği veya kök hücre nakli yapılanlar veya kimerik antijen t-hücresi (CAR-T) tedavisi alanlar;
- Doğuştan gelen karmaşık kalp hastalığı olanlar;
- Yapısal hava yolu anormalliği ya da kronik akciğer hastalığı olanlar;
- Tip 1 diyabeti olanlar;
- Kronik nörolojik veya nöromasküler sorunları olanlar veya
- Önemli seviyede ya da karmaşık sağlık sorunları veya birden fazla hastalık eşlik eden ve ağır COVID-19 geçirme riskini artıran engeli olanlar (serebral palsi veya Down sendromu gibi).

Bu çocukların COVID-19 nedeniyle ileri derecede hastalanma riski daha yüksektir. COVID-19 aşısı olmaları bu riskin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Aşı olabilecekler listesinde yer almayan 6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocukların COVID-19 nedeniyle ileri derecede hastalanma riskleri çok düşüktür. Şimdilik bu çocukların COVID-19 aşısı olmaları **önerilmemektedir**.

6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocuklar hangi aşığı olacak?

Çocuklara yönelik Moderna COVID-19 aşısı (Spikevax) ile çocuklara yönelik Pfizer COVID-19 aşısı (Comirnaty) 6 aylık ile 4 yaş aralığında olan bazı çocuklar için onaylanmıştır.

Çocuklara primer dozları için aynı aşı markası uygulanmalıdır. Pfizer aşısı 8 hafta arayla vurulan 3 dozdur. Moderna aşısı 8 hafta arayla vurulan 2 dozdur.

Bağıışıklığı ileri derecede kısıtlanmış bazı çocuklar Moderna aşısının 3 primer dozuna ihtiyaç duyabilir.

Çocuğumun hatırlatma dozuna ihtiyacı olacak mı?

6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocuklar için COVID-19 aşısı hatırlatma dozu önerilmemektedir.

Ağır COVID-19 risk faktörleri olan 5 yaş ve üstü bazı çocukların son dozlarından 3 ay sonra hatırlatma dozu vurulması önerilir. Pfizer COVID-19 aşısı 5 – 15 yaş grubundaki çocuklarda hatırlatma dozu olarak kullanımı onaylanan tek aşıdır.

COVID-19 aşıları ve diğer aşılar

Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), ateş gibi yan etkilerin riskini en aza indirmek için 6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocukların COVID-19 aşıları ile diğer aşılar arasında 7 ila 14 gün beklemelerini önermektedir. Bununla beraber, uzak bölgelerdeki sosyal yardım programları gibi durumlarda ayrı zamanlarda yapılmalarında zorluk olacaksa COVID-19 aşısı diğer aşılarla aynı zamanda yapılabilir.

Çocuğunuz COVID-19 geçirdiyse

Çocuğunuzun COVID-19 testi pozitif çıkarsa COVID-19 aşısı olabilmesi için testten sonra 3 ay beklemesi gerekir. Çocuğunuz aşı olabilecekler listesindeyse sonraki planlanan COVID-19 aşısı 3 aylık süre geçtikten sonra mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır. Çocuğunuz yine de kendisi için önerilen tüm dozları vurulmalıdır.

Çocuğumun aşı olması için ne zaman randevu alabilirim?

Bu yaş grubunda olup gerekli şartları karşılayan çocuklar için Aşı Kliniği Bulucu üzerinden randevular açılmıştır: <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/>

Aşı sağlayıcılar yeni randevular eklemeye devam edeceği için düzenli olarak kontrol edin.

Daha fazla bilgi



Daha fazla bilgi için www.health.gov.au adresine gidin ya da 1800 020 080 numaralı telefondan Ulusal Koronavirüs Yardım hattını arayın. Ücretsiz tercüme hizmetleri için 8'i tuşlayın.