



การรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการรับประทานยา

พฤษภาคม 2023

การรักษาโรคติดเชื้อ for COVID-19 ด้วยการรับประทานยาคืออะไร?

การรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการรับประทานยา

คือยาเม็ดหรือแคปซูลที่รับประทานสำหรับคนที่มีผลการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19

เป็นบวกที่มีสิทธิ์ ข้อดีของยาเหล่านี้คือคนหลายคนจะสามารถรับการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19

ในบ้านของพวกเขาโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน

การรักษาด้วยการรับประทานยาคควรรับประทานอย่างไรและเมื่อไร?

ยานี้เป็นยาเม็ดหรือแคปซูลที่ใช้รับประทานทุก 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 5 วัน

คุณควรเริ่มรับประทานยาภายในเวลา 5

วันจากเมื่ออาการปรากฏหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้หลังการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19

ได้ผลเป็นบวก

ใครมีสิทธิ์ได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยา?

คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

หากคุณตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ผลเป็นบวกและอายุ 18 ปีขึ้นไป คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับยารักษาทางปาก หากคุณ

- มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรง (ตามรายการที่ปรากฏด้านล่าง) หรือ
- เคยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจากการเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 มาก่อนและเป็นอีกครั้งหนึ่ง

อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงรวมถึง:

- โรคกระดูกพรุนหรือความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดงบางอย่าง (โรคธาลัสซีเมีย โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว)

- ผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
- ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV)
- รับเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัดทั้งตัวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- รับการรักษาด้วยยาต้านอักเสบคอร์ติโคสเตอรอยด์หรือการรักษาแบบ “pulse therapy” ที่มีปริมาณสูงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- การรักษาที่กดภูมิคุ้มกันในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- ยาริทูซิแมบ (Rituximab) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
- ภาวะสมองพิการ (cerebral palsy) หรือดาวน์ซินโดรม
- โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital heart disease)
- การมีชีวิตอยู่กับความทุพพลภาพที่มีภาวะหลายอย่างและ/หรือความอ่อนแอ

ผู้สูงอายุและชนพื้นเมือง Aboriginal and Torres Strait Islander

หากคุณเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นชนพื้นเมือง Aboriginal and Torres Strait Islander และตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ผลเป็นบวก คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการรักษาด้วยยาทางปาก

หากคุณ:

- อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปที่ไม่จำกัดปัจจัยความเสี่ยง และมีหรือไม่มีอาการ
- อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม (ตามที่ระบุด้านล่าง)
- ชนพื้นเมือง Aboriginal หรือ Torres Strait Islander อายุ 30 ปีขึ้นไปและมีปัจจัยความเสี่ยง **1** อย่าง (ตามที่ระบุด้านล่าง)

ปัจจัยความเสี่ยง:

- อาศัยอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ
- มีชีวิตอยู่ด้วยความทุพพลภาพพร้อมภาวะหลายอย่างและ/หรือความเปราะบาง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับการสนับสนุน)
- ภาวะทางระบบประสาทเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะสมองเสื่อม และโรคปอดประสาทอักเสบ เช่น โรคปอดประสาท กลุ่มอาการกิลเล-บาร์เร
- ภาวะระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหอบหืดปานกลางหรือรุนแรง
- โรคอ้วนเกินไปหรือโรคเบาหวาน (ประเภท I หรือ II ที่ต้องช้ยา)
- ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
- ไตวายหรือโรคตับแข็ง

- อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงการดูแลสุขภาพระดับสูงกว่า

ยาเหล่านี้ไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ดังนั้นกรุณาพูดกับแพทย์ของคุณเพื่อเช็คว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่

ฉันจะได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาได้อย่างไรและที่ไหน?

คุณต้องมีใบสั่งยาเพื่อที่จะได้รับการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการรับประทานยา
คุณสามารถรับยานี้พร้อมใบสั่งยาได้จากร้านขายยา

การรักษาด้วยยาทางปากได้รับการอุดหนุนหรือไม่?

คนที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาทางปากที่ได้รับการอุดหนุนผ่าน Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) ด้วยใบสั่งยาจากผู้ออกใบสั่งยาที่ได้รับอนุมัติ เช่น แพทย์

คนที่ตรวจ COVID-19 ได้ผลเป็นบวกแต่ไม่มีบัตร Medicare

สามารถติดต่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาได้จากคลินิกแพทย์จีพีทางโรคระบบทางเดินหายใจ

ใครไม่ควรได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยา?

ไม่แนะนำให้สตรีมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรใช้การรักษาด้วยการรับประทานยา –

ยิ่งทำให้สำคัญมากขึ้นที่สตรีมีครรภ์และกำลังให้นมบุตร ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

การรักษาบางอย่างไม่ปลอดภัยที่จะใช้ควบคู่กับยาอย่างอื่นบางอย่าง และไม่ควรใช้ในคนที่
เป็นโรคไตหรือโรคตับรุนแรง กรุณาพูดกับแพทย์ของคุณว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ

การรักษาด้วยการรับประทานยาและภาวะการมีบุตรยาก

หากคุณได้รับใบสั่งยาเพื่อการรักษาด้วยการรับประทานยาสำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19
คุณต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำเนิด เพราะการรักษาอาจส่ง
ผลกระทบต่อวิธีการทำงานของการคุมกำเนิดของคุณ พูดกับแพทย์ของคุณหากคุณมีคำถาม
เกี่ยวกับยาคุมกำเนิดชนิดต่าง ๆ และว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ

การฉีดวัคซีนและการรักษาด้วยการรับประทานยา

การรักษาเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใช้แทนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

การฉีดวัคซีนคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวคุณเอง
คนที่คุณรักและชุมชนในวงกว้างจากโรคติดเชื้อ COVID-19

การอนุมัติ

ยาทั้งหมดในออสเตรเลียต้องได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้โดย Therapeutic Goods Administration (TGA) TGA คือนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผู้ควบคุมและอนุมัติวัคซีน ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับการใช้ในออสเตรเลีย TGA มีมาตรฐานเคร่งครัดสำหรับการอนุญาตใช้ยาในออสเตรเลีย พวกเขาอนุมัติเฉพาะยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางปากด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 และการสนับสนุนในภาษาของคุณ โทรถึง National Coronavirus Helpline ที่หมายเลข 1800 020 080 และกด 8
สำหรับความช่วยเหลือด้านล่ามฟรี