

កាលវិភាគចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ (កុមារភាព)

អាយុ	ជំងឺ
កំណើត	ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (ជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ)
2 ខែ (អាចផ្តល់ឱ្យ ចាប់ពីអាយុ 6 សប្តាហ៍)	- រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B, ជម្ងឺស្លិតដៃជើង ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ <i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib) - Rotavirus (វីរុសបង្កជំងឺរាក) - ជំងឺ Pneumococcal (ជំងឺន្ទម៉ូខូនល)
4 ខែ	- រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B, ជម្ងឺស្លិតដៃជើង ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ <i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib) - Rotavirus (វីរុសបង្កជំងឺរាក) - ជំងឺ Pneumococcal (ជំងឺន្ទម៉ូខូនល)
6 ខែ	រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B, ជម្ងឺស្លិតដៃជើង ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ <i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib)
6 ខែ ទៅ ក្រោម 5 ឆ្នាំ	ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ (ប្រចាំឆ្នាំ)
12 ខែ	- ជំងឺ Meningococcal ACWY (ជំងឺមេនីញ៉ូដោខូនល ACWY) - រោគកញ្ជ្រើល រោគស្រឡាទែន រោគស្ទូច - ជំងឺ Pneumococcal (ជំងឺន្ទម៉ូខូនល)
18 ខែ	<i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib) - រោគកញ្ជ្រើល រោគស្រឡាទែន រោគស្ទូច រោគអុតស្វាយ - រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់
4 ឆ្នាំ	រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ គ្រុនស្លិតដៃជើង

ព័ត៌មានបន្ថែម

- និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក
- ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ health.gov.au/childhoodimmunisation
- ទាក់ទងក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬដែនដីរបស់អ្នក។