

副作用

接种疫苗后可能出现轻微副作用。大多数副作用通常持续不超过几天，属于免疫系统的正常反应。

常见副作用反应包括：

- 接种部位疼痛、肿胀或发红
- 头痛、疲劳
- 低烧
- 食欲下降
- 头晕或晕厥
- 肌肉酸痛或全身不适

疫苗严重反应极为罕见。若出现严重或异常不适，请立即就医。

疫苗安全性

澳大利亚所有疫苗均经过治疗用品管理局（TGA）严格评估，确保安全有效，并获批使用。疫苗在投入使用后，安全性仍会受到持续监测。

澳大利亚采用的所有疫苗，其益处远大于风险。接种疫苗比感染疾病来得更安全。

疫苗接种记录

医疗专业人员会将接种信息记录在澳大利亚免疫登记系统（AIR）。可通过以下方式获取免疫接种记录证明：

- 访问 my.gov.au 并登录 Medicare 在线账户，或使用 Express Plus Medicare 手机应用程序。
- 拨打 Services Australia 热线：**1800 653 809**，申请纸质副本。
- 请求医疗专业人员打印接种记录。

国家免疫规划表（成人）

年龄/风险情况	疾病
年满70岁 年满50岁（适用于澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民）	● 肺炎球菌
年满65岁 年满50岁（适用于澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民） 符合条件的患病人群	● 带状疱疹 (Shingrix®), 2剂
年满65岁 澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民 符合条件的患病人群	● 每年接种流感疫苗
孕妇*	● 流感疫苗 ● 百日咳 ● 呼吸道合胞病毒 (RSV)

*详情请参阅《孕期疫苗接种指南》。

更多信息

如有疑问，敬请：

- 咨询医疗专业人员
- 访问 health.gov.au/immunisation
- 联系所在州或领地的卫生部。



成人疫苗接种指南

了解免费疫苗接种信息，做好疾病预防准备。

health.gov.au/immunisation





成人常规疫苗 接种

《国家免疫规划表》(National Immunisation Schedule) 明确指出可通过国家免疫计划 (National Immunisation Schedule) 免费接种推荐疫苗。

持有 Medicare 卡或符合条件者可**免费**接种部分疫苗。

各州和领地政府可能有额外的免费疫苗接种计划。

补种疫苗

儿童期未完成疫苗接种的人, 可在满20岁前 (HPV疫苗可在满26岁前) 免费补种。请咨询医疗专业人员, 了解补种方案。

哪里可以接种疫苗

- 当地全科诊所
- 部分州和领地的药房
- 部分地区的社区健康中心或地方政府诊所
- 原住民社区健康服务机构

疫苗免费接种, 但医疗机构可能收取诊疗费或接种服务费。请在预约时加以确认。

肺炎球菌

肺炎球菌病是一种细菌感染疾病, 可能引发肺炎、血液感染和脑膜炎 (大脑周围膜的炎症)。老年人及慢性病患者感染风险较高。肺炎球菌疫苗可预防主要致病菌株感染。

带状疱疹

带状疱疹由水痘病毒再激活引发, 表现为疼痛性水疱, 并可能导致长达数月的神经痛。约三分之一的未接种疫苗者会感染带状疱疹。老年人通常患病风险较高, 且年龄越大, 病情越严重。

符合条件者可通过国家免疫计划 (NIP) 免费接种两剂疫苗。接种疫苗可有效预防带状疱疹及并发症, 免疫功能低下者也可安全接种。

百日咳

百日咳可能导致严重并发症, 如脑损伤、肺炎, 甚至危及生命。

建议孕妇在孕期接种百日咳疫苗, 保护新生儿免受感染。六周龄以下婴儿不适合接种疫苗。

因此婴儿的父母、祖父母、看护者及其他密切接触者也应接种百日咳疫苗, 保护婴儿不被感染。百日咳疫苗需自费接种。

流感

流感是一种高度传染性的呼吸道感染疾病。老年人尤其易受严重影响。即使是健康人群, 也可能因流感引发重症甚至危及生命。

流感病毒每年可能变异, 因此流感疫苗可能随季节更新。

因此, 每年都要接种流感疫苗。年满65岁的人群可接种加强版疫苗。

符合条件的患病人群

符合条件的患病人士可额外免费接种肺炎球菌、脑膜炎球菌等疫苗。请咨询医疗专业人员, 了解接种这类疫苗的建议。

难民及人道主义入境者

对于难民及人道主义入境者, 无论年龄大小, 均可免费补种儿童期漏种疫苗。请咨询医疗专业人员, 了解补种方案。

加强针

对于已接种的疫苗, 可能需要接种加强针 (如破伤风、百日咳等)。请咨询医疗专业人员, 了解接种意见。加强针需自费接种。