

副作用

接種疫苗後，您可能會出現輕微副作用。大多數副作用不會持續超過幾天，並且這是免疫系統對疫苗的自然反應的一部份。

常見反應包括：

- 注射部位疼痛、腫脹或發紅
- 食慾下降
- 頭痛、疲勞
- 感覺頭暈和昏厥
- 輕微發燒
- 肌肉 / 身體疼痛。

對疫苗產生嚴重反應的情況很罕見。若您認為反應嚴重或出乎意料，請立即就醫。

疫苗非常安全

在澳洲的所有疫苗均經過治療產品管理局的評估，在獲准使用前確保其安全有效。一旦投入使用，其安全性將繼續受到監控。

所有在澳洲使用的疫苗所帶來的好處遠遠超過風險。接種疫苗比感染疾病更安全。

疫苗接種記錄

您的醫療專業人員會在澳洲免疫接種登記冊 (AIR) 上記錄您接種的疫苗。您可以透過以下方式從 AIR 取得免疫接種記錄書：

- 瀏覽 my.gov.au 並登入以存取您的 Medicare 線上帳戶或使用 Express Plus Medicare 手機應用程式
- 致電澳洲服務處 (Services Australia)，電話：**1800 653 809** 索取副本
- 要求您的疫苗接種提供者為您列印副本。

國家免疫接種時間表 (成人)

年齡/風險狀況	疾病
70 歲或以上 50 歲或以上的國家原住民和托雷斯海峽群島島民	● 肺炎球菌
65 歲或以上 50 歲或以上的國家原住民和托雷斯海峽群島島民 患有符合條件疾病的人士	● 帶狀皰疹 (Shingrix®), 2 劑
65 歲或以上 國家原住民和托雷斯海峽群島島民 患有符合條件疾病的人士	● 每年流感
孕婦*	● 流感 ● 百日咳 ● 呼吸道合胞病毒 (RSV)

*參閱孕產婦疫苗接種手冊

更多資料

若您有疑問，您可以：

- 諮詢您的醫療專業人員
- 瀏覽 health.gov.au/immunisation
- 聯絡您所在州或領地的衛生部門。



成人疫苗接種

免費疫苗資訊，保護您免受有害疾病侵害。

health.gov.au/immunisation





成人常規疫苗 接種

國家免疫接種時間表概述了國家免疫計劃 (NIP) 下免費提供的建議疫苗。

成年人只要有 Medicare 卡或符合資格，即可免費接種疫苗。

根據州和領地政府的計劃，可能會免費提供額外疫苗。

錯過接種疫苗

在兒童時期錯過接種疫苗的人可以免費補種，直至年滿 20 歲，或 HPV 疫苗為 26 歲止。和您的醫療專業人員談談。

在何處接種疫苗

- 當地全科醫生
- 一些州或領地的藥房
- 一些地區的社區健康或地方議會診所
- 原住民社區健康服務中心。

雖然疫苗是免費的，但您的醫療專業人員可能會收取諮詢費用或行政費。當您預約時請查詢費用。

肺炎球菌

肺炎球菌病是一種細菌感染。它可導致肺炎、血流感染和腦膜炎（包圍腦的膜發炎）。對於長者和有病患人士來說，病情可能會更加嚴重。肺炎鏈球菌疫苗可以預防最常引致疾病的菌株。

帶狀皰疹

帶狀皰疹是一種因水痘病毒復發而引起的疼痛且起水泡的皮疹。它還會引致持續數月的嚴重神經痛。若沒有接種疫苗，大約三分之一的人一生中會罹患帶狀皰疹。帶狀皰疹通常影響長者。若您患上帶狀皰疹，隨著年齡增長，嚴重疾病的風險會增加。

NIP 會為符合條件的人免費提供兩劑帶狀皰疹疫苗。該疫苗可有效預防帶狀皰疹及其併發症，並且對於免疫功能低下的人來說也是安全。

百日咳

百日咳會引致嚴重併發症，包括腦部受損、肺炎，有時甚至會導致死亡。

建議孕婦在每次懷孕期間接種百日咳疫苗，以保護嬰兒免受百日咳的侵害。六週歲以下的嬰兒因年紀太小，不直接種百日咳疫苗。

與嬰兒有接觸的人，如您的伴侶、祖父母、照顧者和其他成年人也應該接種百日咳疫苗，以保護嬰兒免受感染。這不是免費提供。

流感

流感是一種傳染性極強的呼吸道感染。對長者來說，這尤其嚴重。即使是健康人士也可能因此患上嚴重疾病，甚至死亡。

流感病毒的病毒株每年都會有變化，因此疫苗也可能隨著季節變化而更新。

這是為何每年接種疫苗如此重要。目前有一種增強型疫苗可供 65 歲及以上的長者使用。

患有符合條件疾病的人士

患有符合條件疾病的成人還可以免費接種其他疫苗，例如肺炎球菌疫苗和腦膜炎球菌疫苗。請諮詢您的醫療專業人員，以了解是否建議您接種此等疫苗。

難民或人道原因入境者

若您是難民或人道原因入境者，您可以不論年齡免費補種錯過的兒童疫苗。和您的醫療專業人員談談。

疫苗加強劑

您可能需要接種先前接種過的疫苗的加強劑，例如破傷風和百日咳疫苗。請諮詢您的醫療專業人員以取得建議。接種加強劑不是免費。