

# برنامج التحصين الوطني ورقة حقائق لمستهلكي لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)



National  
Immunisation  
Program

A joint Australian, State and Territory Government Initiative

لا يتم تمويل لقاحات RSV لهذه الفئات من خلال NIP أو برامج الولايات والمقاطعتين، بل يمكن شراؤها من السوق الخاصة، ولكن لا يمكن المطالبة بالتكلفة أو استردادها من خلال NIP أو برامج الولايات أو المقاطعتين.

## لقاح فيروس RSV مهم بشكل خاص خلال الحمل

يساعد لقاح RSV الخاص بالأمهات اللواتي ينتظرن مولودًا على حماية مولودهن الجديد من ذلك الفيروس.

ويُعدّ RSV سببًا رئيسيًا لإدخال الأطفال دون سن 6 أشهر إلى المستشفى. وحتى الرضع والأطفال الأصحاء يمكن أن يُصابوا بمرض شديد بسبب RSV.

تشير الأبحاث إلى أن تحصين الأمهات اللواتي يتوقعن مولودًا يُقلل من خطر إصابة الرضع دون سن 6 أشهر بمرض شديد بسبب RSV بنسبة 70% تقريبًا.

بواسطة التلقيح خلال الحمل يمكن انتقال الأجسام المضادة إلى طفلك عبر المشيمة. وهذا يحمي طفلك منذ الولادة وخلال الأشهر الأولى من حياته، عندما يكون ضعيفًا، من إصابته بـ RSV.

## النساء الحوامل

يُنصح بتلقي النساء الحوامل جرعة واحدة من لقاح RSV الخاص بالأمهات اللواتي يتوقعن مولودًا، وهو مجاني من خلال برنامج NIP للنساء المؤهلات في الفترة من 28 إلى 36 أسبوعًا من حملهن.

يمكنك تلقي لقاح RSV بأمان في نفس الزيارة التي تتلقين فيها لقاحات الأمهات اللواتي يتوقعن مولودًا ضمن "برنامج التحصين الوطني" (NIP) ضد الإنفلونزا والسعال الديكي أو لقاحات كوفيد-19، إذا أوصى لك بها الاختصاصي الذي تثقين به.

## الرضع والأطفال

يُنصح بإعطاء الرضع حتى سن 8 أشهر والأطفال حتى سن سنتين جرعة واحدة من منتج التحصين ضد RSV في الحالات التالية:

- إذا كانت أمهاتهم لم يتلقين لقاح RSV خلال الحمل، أو
- إذا كانوا قد وُلدوا خلال أسبوعين بعد تلقي الأم لقاح RSV، أو
- إذا كانوا يُعانون من حالة أو ظرف يزيد من خطر إصابتهم بمرض RSV الحاد.

يُنصح بإعطاء الأطفال الصغار الذين يبلغون من العمر بين 8 أشهر وسنتين (2) والذين لديهم حالات مُعينة تُعرضهم لخطر الإصابة بمرض RSV الشديد منتج التحصين ضد RSV قبل وصول موسم RSV الثاني في حياتهم.

## نبذة عن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس شائع يمكن أن يسبب مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، مثل التهاب القصيبات الهوائية لدى الأطفال والالتهاب الرئوي.

ينتشر RSV بواسطة قطرات سعال أو عطس شخص مصاب به. هذه القطرات يمكن أن يستنشقها أشخاص آخرون أو أن تستقر على أسطح يمكن للفيروس أن يظل عليها حيًا لعدة ساعات.

تشمل أعراض مرض RSV ما يلي:

- سيلان الأنف
- السعال
- الحمى
- الصفير أو صعوبة التنفس.

وهو قد يكون مرضًا خفيفًا لدى البعض، لكنه قد يُسبب مرضًا خطيرًا يتطلب الإدخال إلى المستشفى في حالة الأطفال والبالغين الأصحاء من النواحي الأخرى.

يحمي التلقيح ضد RSV خلال الحمل مولودك الجديد من هذا الفيروس منذ ولادته وخلال الأشهر القليلة الأولى من حياته حين يكون ضعيفًا.

## الأشخاص الذين يُنصحون بتلقي لقاح RSV

يُنصح النساء في الفترة من 28 إلى 36 أسبوعًا من حملهن بتلقي لقاح RSV (Abrysvo®) لحماية أطفالهن الرضع من المرض الخطير الذي يسببه الفيروس. واللقاح مُتاح مجانًا للنساء المؤهلات من خلال "برنامج التحصين الوطني" (NIP).

## الأشخاص الذين يُنصحون بتلقي أحد منتجات

### التحصين ضد RSV

قد يُنصح بإعطاء الرضع حتى سن 8 أشهر والأطفال حتى سن سنتين (2) منتج التحصين ضد RSV، وهو (Beyfortus™) (nirsevimab). هذا اللقاح مُتاح مجانًا من خلال برامج الولايات والمقاطعتين الخاصة بحماية الرضع من RSV. إذا كانت لديك أسئلة بشأن هذه البرامج، تحدثي مع اختصاصي الرعاية الصحية أو دائرة الصحة في الولاية أو المقاطعة.

يُنصح السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس الذين يبلغون من العمر 60 عامًا فأكثر، والأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا فأكثر ويعانون من حالات طبية خطيرة، والبالغون الذين في سن 75 عامًا فأكثر، بتلقي لقاحات RSV. ويمكن للأشخاص الذين بين سن 60 و74 عامًا التفكير في تلقي لقاح RSV.

## الأماكن التي يمكنك الحصول منها على لقاحات RSV أو منتجات التحصين ضده

يمكن حجز مواعيد لتلقي لقاحات NIP الخاصة بالأمهات اللواتي يتوقعن مولودًا في مجموعة من الخدمات الصحية، بما في ذلك:

- أخصائيو صحة الأمهات اللواتي يتوقعن مولودًا أو العيادات العامة
- عيادات التحصين التابعة لمجالس البلديات (متوفرة في بعض الولايات والمقاطعتين)
- مراكز الصحة المجتمعية
- خدمات صحة السكان الأصليين
- الصيدليات المشاركة.

لا تقدم جميع هذه الخدمات الصحية لقاحات NIP الخاصة بالأمهات اللواتي يتوقعن مولودًا مجانًا. تحقق من الأمر مع خدمة الرعاية الصحية التي تفضلينها لمعرفة ما إذا كانت متوفرة ومتى يمكنك حجز موعد لتلقيك.

سيتوفر منتج التحصين ضد RSV الخاص بالرضع من خلال برامج حماية الرضع ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في ولايتك أو مقاطعتك. تحقق من ذلك مع دائرة الصحة في ولايتك أو مقاطعتك لمعرفة مكان وكيفية حجز موعد.

## سجل التحصين الأسترالي

ينبغي على اختصاصي الرعاية الصحية الذي تتعاملين معه مراجعة "سجل التحصين الأسترالي" (AIR) دائمًا قبل إعطائك أو إعطاء رضيعك أي لقاح أو منتج تحصيني. كما ينبغي عليه إبلاغ AIR بجميع التحصينات التي يقدمها لضمان اكتمال ودقة سجل التحصينات الخاص بك وبطفلك الرضيع.

## مزيد من المعلومات

لمعرفة المزيد عن RSV والتلقيح، يُرجى زيارة:

- دائرة الصحة ورعاية المسنين على الموقع [health.gov.au/immunisation](http://health.gov.au/immunisation)
- الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة في ولايتك أو مقاطعتك أو اختصاصي الصحة الذي تثقين به
- المركز الوطني لأبحاث ومراقبة التحصين على الموقع [ncirs.org.au](http://ncirs.org.au)

من الأمان إعطاء طفلك منتج التحصين ضد RSV إما بمفرده أو في نفس موعد إعطائه لقاحات الأطفال الروتينية الأخرى.

يتوفر منتج التحصين ضد RSV الخاص بالرضع والأطفال مجانًا من خلال برامج حماية الرضع من RSV في الولايات والمقاطعتين.

## السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس، وكبار السن، والمعرضون للخطر طبيًا

لا يتم حاليًا تمويل لقاحات RSV للأشخاص البالغين من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات خطر طبي، أو كبار السن، من خلال "برنامج التحصين الوطني" (NIP) أو برامج التلقيح في الولايات أو المقاطعتين.

وفي حين أنه يمكنك شراء لقاحات RSV من السوق الخاصة، فإنه لا يمكنك استرداد تكلفتها من خلال NIP.

يمكنك تلقي لقاح RSV بأمان في نفس الزيارة مع لقاحات أخرى موسى بها، مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد-19.

## سلامة لقاحات RSV ومنتجات التحصين ضده

إن لقاح RSV ومنتج التحصين ضده كلاهما آمنان وفعالان، إذ تقوم "إدارة السلع العلاجية" (Therapeutic Goods Administration) بإجراء اختبارات على جميع اللقاحات والمنتجات والأدوية قبل الموافقة على استخدامها في أستراليا.

تشمل الآثار الجانبية للقاحات RSV ومنتجات التحصين ضده الألم الخفيف، والاحمرار أو التورم في مكان الحقن، والتعب، والصداع. وهي تستمر عادةً لبضعة أيام وتزول دون أي علاج. أما الآثار الجانبية الخطيرة، مثل رد الفعل التحسسي الشديد، فإنها نادرة.

## أرقام الاتصال بدوائر الصحة في الولايات والمقاطعتين:

SA 1300 232 272	ACT 02 5124 9800
TAS 1800 671 738	NSW 1300 066 055
VIC immunisation@health.vic.gov.au	NT 08 8922 8044
QLD اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية	WA 08 9321 1312