



**NATIONAL
BOWELCANCER**
SCREENING PROGRAM

**ព័ត៌មានអំពីការទទួល
បានការឆ្លុះពិនិត្យមើល
ផ្នែកខាងក្នុងនៃ
ពោះវៀនធំ**



សម្រាប់ព័ត៌មានជាភាសារបស់អ្នក
សូមហៅទូរសព្ទទៅសេវាបកប្រែភាសាសរសេរ
និងភាសាផ្ទាល់មាត់៖ 13 14 50 ឬចូលមើល
www.health.gov.au/nbcsp-translations

ការធ្វើតេស្តពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីកពោះវៀនរបស់អ្នកបានរកឃើញ ឈាមនៅក្នុងឈាមករបស់អ្នក។ វាអាចមានហេតុផលជាច្រើនដែលឈាម ត្រូវបានរកឃើញ ភាគច្រើនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺមហារីកទេ ប៉ុន្តែវាសំខាន់ ណាស់ក្នុងការស្វែងរកមូលហេតុនោះ។

□ ធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានរបស់អ្នក ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចណែនាំឱ្យធ្វើតេស្ត មួយហៅថា ការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ។

អំពីការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ

ការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ គឺជានីតិវិធីដែលប្រើបំពង់ បត់បែនស្ទើង ដែលមានដាក់ភ្ជាប់កាមេរ៉ាតូចមួយហៅថា ឧបករណ៍ឆ្លុះ ពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ (ឧបករណ៍ឆ្លុះ) ដើម្បីមើលខាងក្នុង ពោះវៀនរបស់អ្នក។

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងផ្តល់ថ្នាំដើម្បីឱ្យអ្នកសម្រាកបន្ត (ហៅថា ការសណ្តាំ)។

ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងដេក វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបញ្ចូលឧបករណ៍ឆ្លុះតាមតូច របស់អ្នក និងចូលទៅក្នុងពោះវៀនរបស់អ្នក ដើម្បីរកមើលដុំពក ឬសាច់ដុះ។

អ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ដឹងរឿងនោះ ឬដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុង ពេលនៃការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំទេ។

នីតិវិធីត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ 45 នាទី។ អ្នកអាចរំពឹងថានឹងនៅ មន្ទីរពេទ្យរយៈពេល 3 ទៅ 4 ម៉ោង។

អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ របស់អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ឬមន្ទីរពេទ្យឯកជន ឬគ្លីនិកឯកជន។

ហេតុអ្វីបានជាវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំណែនាំឱ្យធ្វើ ការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ?

- ការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ គឺជានីតិវិធីល្អបំផុតដើម្បី ពិនិត្យរកមូលហេតុនៃការហូរឈាម។
- ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកាត់ចេញដុំពក ឬសាច់ដុះដែលបានរកឃើញ។
- ដុំពក គឺជាសាច់ដុះតូចមួយដែលនៅភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងពោះវៀន ដែល ជួនកាលអាចរីកធ្លាក់ទៅជាជំងឺមហារីក។
- ការកាត់ដុំពកចេញអាចជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីក ហើយមិនមានការ ឈឺចាប់ទេ។
- ដុំពក ឬសាច់ដុះដែលបានកាត់ចេញត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីមើលថាតើវាជាដុំពកគំរាមកំហែងជីវិត (ជំងឺមហារីក) ឬដុំពក ដែលមិនលូតលាស់ (គ្មានគ្រោះថ្នាក់)។

តើខ្ញុំត្រូវត្រៀមលក្ខណៈបែបណាសម្រាប់ការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ?

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាព ឬពិសាថ្នាំពេទ្យជាប្រចាំ សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមការត្រៀមរៀបការឆ្លុះពិនិត្យមើលវៀនរបស់អ្នក។ ពួកគេអាចប្រាប់អ្នកឱ្យឈប់ពិសាថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនសម្រាប់រយៈពេលពីរបីថ្ងៃមុនពេលការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំរបស់អ្នក។

អ្នកនឹងត្រូវបានប្រាប់ពីរបៀបត្រៀមរៀបចំ ដែលទាក់ទងនឹង៖

- **របបអាហារ។** អ្វីខ្លះដែលត្រូវបរិភោគ និងផឹកនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំរបស់អ្នក។
- **ការត្រៀមរៀបការឆ្លុះពិនិត្យវៀន។** របៀបទទួលបានកញ្ចប់ថ្នាំដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកទៅបង្គន់ដើម្បីសម្អាតពោះវៀនរបស់អ្នក។

អ្នកត្រូវតែធ្វើតាមការណែនាំអំពីការត្រៀមរៀបចំពោះវៀនដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិតអាចមើលឃើញនៅខាងក្នុងពោះវៀនរបស់អ្នក។ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកអាចត្រូវធ្វើការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំម្តងទៀត។

តើមានអ្វីខ្លះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ?

នៅពេលអ្នកក្រោកដឹងខ្លួនពីការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំហើយ អ្នកនឹងត្រូវបានគេផ្តល់អាហារ និងភេសជ្ជៈ។ អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះបន្តិច ប៉ុន្តែវានឹងមានរយៈពេលប្រហែលតែមួយម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចហូរឈាមបរិមាណតិចតួច ប៉ុន្តែនេះគឺជាជឿនធម្មតាទេ។

អ្នកនឹងត្រូវបានប្រាប់ពីរបៀបដែលវាបានដំណើរការ របៀបថែទាំខ្លួនអ្នកនៅពេលអ្នកទៅដល់ផ្ទះ ពេលណាត្រូវចាប់ផ្តើមរបបអាហារធម្មតា និងថ្នាំពេទ្យរបស់អ្នកឡើងវិញ និងការតាមដានណាមួយដែលចាំបាច់។ មិត្តភក្តិ ឬសមាជិកគ្រួសារត្រូវតែនាំអ្នកទៅផ្ទះ ហើយស្នាក់នៅជាមួយអ្នក។

អ្នក និងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់នូវរបាយការណ៍មួយអំពីការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ និងលទ្ធផលតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ណាមួយ។

អ្នក ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកគួរតែរាយការណ៍ពីលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍របស់អ្នកទៅបញ្ជីគ្រូពិនិត្យជំងឺមហារីកថ្នាក់ជាតិ។

ដោយសារតែអ្នកត្រូវបានគេផ្តល់នូវការសណ្តំ សម្រាប់រយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំរបស់អ្នក នោះមិនត្រូវ៖

- បើករថយន្ត
- ធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯង
- ប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីន
- ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់
- ផឹកគ្រឿងស្រវឹង។

តើការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំមានភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាដែរ?

ការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំគឺមានភាពត្រឹមត្រូវណាស់ ហើយជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីរកឱ្យឃើញពីមូលហេតុដែលអ្នកទទួលបាន លទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន។ វានៅតែមានឱកាសតិចតួចដែលអ្វីមួយអាចមិនត្រូវបានឆ្លុះរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលនៃនីតិវិធីរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើគ្មានជំងឺមហារីក ឬដុំពកត្រូវបានរកឃើញទេ អ្នកគួរតែបន្តការពិនិត្យជាមួយនឹងកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺមហារីកពោះវៀនថ្នាក់ជាតិ។ នៅពេលជិតដល់ពេលការពិនិត្យបន្ទាប់ទៀត យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកនូវការធ្វើតេស្តមួយទៀត។

តើមានហានិភ័យ ឬផលប៉ះពាល់អ្វីទេ?

ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំគឺមិនមានជាទូទៅទេ។ អ្នកអាចនឹងមានការឈឺក្បាល ឬក្អកដោយសារការត្រៀមរៀបចំពោះវៀន ឬមានហូរឈាមក្រោយការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ។ អ្នកអាចមានប្រតិកម្មចំពោះការសណ្តាំ ប៉ុន្តែរឿងនេះកម្រណាស់។ វាកម្រណាស់ដែលមនុស្សខ្លះត្រូវចូលទៅមន្ទីរពេទ្យវិញ។

អ្នកគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីហានិភ័យ ឬការព្រួយបារម្ភណាមួយ នៅមុនការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំរបស់អ្នក។

តើមានការចំណាយលើការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំដែរឬទេ?

ក្នុងនាមជាអ្នកជំងឺសាធារណៈនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ មិនមានការចំណាយលើការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជំងឺឯកជន អ្នកអាចត្រូវបង់ប្រាក់ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ អាស្រ័យលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់កញ្ចប់ត្រៀមរៀបចំការឆ្លុះពិនិត្យពោះវៀន។

សំណួរ?

ខិត្តប័ណ្ណនេះអាចជួយអ្នកឱ្យយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការឆ្លុះពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះវៀនធំ។ វេជ្ជបណ្ឌិត ឬមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។



ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីកពោះវៀនថ្នាក់ជាតិ

www.health.gov.au/nbcsp