

កាលវិភាគចាក់ថ្នាំបង្ការថ្នាក់ជាតិ (កុមារភាព)

អាយុ	ជំងឺ
កំណើត	ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (ជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ)
2 ខែ (អាចផ្តល់ឱ្យចាប់ពីអាយុ 6 សប្តាហ៍)	- រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B, ជម្ងឺស្លឹកដៃជើង ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ <i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib) - Rotavirus (វីរុសបង្កជំងឺរាក) - ជំងឺ Pneumococcal (ជំងឺន្ទម៉ូខូនល)
4 ខែ	- រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B, ជម្ងឺស្លឹកដៃជើង ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ <i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib) - Rotavirus (វីរុសបង្កជំងឺរាក) - ជំងឺ Pneumococcal (ជំងឺន្ទម៉ូខូនល)
6 ខែ	រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B, ជម្ងឺស្លឹកដៃជើង ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ <i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib)
6 ខែ ទៅ ក្រោម 5 ឆ្នាំ	ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ (ប្រចាំឆ្នាំ)
12 ខែ	- ជំងឺ Meningococcal ACWY (ជំងឺមេនីញ៉ូដោខូនល ACWY) - រោគកញ្ជ្រើល រោគស្រឡាទែន រោគស្ងួច - ជំងឺ Pneumococcal (ជំងឺន្ទម៉ូខូនល)
18 ខែ	<i>Haemophilus influenzae</i> ប្រភេទ b (Hib) - រោគកញ្ជ្រើល រោគស្រឡាទែន រោគស្ងួច រោគអុតស្វាយ - រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់
4 ឆ្នាំ	រោគខាន់ស្លាក់ រោគតេតាណូស រោគក្អកមាន់ គ្រុនស្លឹកដៃជើង

កុមារដែលមានមានបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់មួយចំនួន មានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងបន្ថែមដោយឥតគិតថ្លៃ ដូចជាជំងឺ pneumococcal (ជំងឺន្ទម៉ូខូនល) និងជំងឺ meningococcal (ជំងឺមេនីញ៉ូដោខូនល) ជាដើម។ សូមពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នផ្តល់សេវាកម្មចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យបានដឹងថាតើកូនរបស់អ្នកត្រូវការវ៉ាក់សាំងបន្ថែមដែរឬទេ។ ព័ត៌មានទាំងអស់គឺត្រឹមត្រូវគិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2025។

តើមានសំណួរទេ?

- សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ health.gov.au/childhoodimmunisation
- ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយស្ថាប័នផ្តល់សេវាកម្មចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក