

لقاح المكورات السحائية ACWY للمراهقين

يُعد مرض المكورات السحائية خطيراً، إلا أنه
يمكنكم الوقاية منه.



health.gov.au/immunisation

ما مدى سلامة اللقاح؟

يعتبر لقاح المكورات السحائية آمناً. فقد تم توفير برامج التطعيم ضد
المكورات السحائية (ACWY) للمراهقين في المملكة المتحدة منذ عام
2015 وفي الولايات المتحدة منذ عام 2005.

على غرار جميع اللقاحات، قد يعاني بعض الناس من ردة فعل نتيجة اللقاح.

وعادة ما يكون خفيفاً و يمكن أن يشمل:

- ✓ ألاماً أو تورماً أو احمراراً في موقع الحقن
- ✓ الصداع، والتعب، والحمى
- ✓ الغثيان وفقدان الشهية.

الآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن اللقاح نادرة للغاية.

اطلب المشورة الطبية إذا كنت قلقاً بشأن رد فعل طفلك.

لقاح المكورات السحائية ACWY للمراهقين

يمكنك معرفة المزيد حول سلامة لقاحات
المكورات السحائية في موقع إدارة السلع
العلاجية على الشبكة tga.gov.au

health.gov.au/immunisation

ما مدى فعالية اللقاح؟

يعتبر لقاح المكورات السحائية طريقة آمنة وفعالة للمساعدة في وقاية
الشباب من مرض المكورات السحائية.

ان جرعة واحدة من لقاح المكورات السحائية (ACWY) ناجعة للغاية
لتوفير الوقاية من هذه الأنواع الأربعة من مرض المكورات السحائية.



لقاح المكورات السحائية ACWY للمراهقين

ما هو مرض المكورات السحائية؟

يحدث مرض المكورات السحائية عندما تغزو بكتيريا المكورات السحائية، التي تتواجد عادة في الأنف أو الحلق، الجسم وتتسبب بمرض خطير.

المراهقون الأكبر سناً والشباب اليافعون هم الأكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا ونقلها للآخرين.

هناك عدد من الأنواع المختلفة من بكتيريا المكورات السحائية. في جميع أنحاء العالم، الأنواع الرئيسية المسببة لمرض المكورات السحائية هي A و B و C و W و Y.

تشمل أعراض مرض المكورات السحائية الحمى، أو الصداع، أو القيء، أو تصلب الرقبة، أو آلام في العضلات، ويعقبها أحياناً طفح أحمر أو أرجواني.

يمكن أن يتسبب المرض بمضاعفات بما في ذلك إعاقات دائمة من خلال فقدان الأطراف، أو الصمم أو العمى، أو ترك الندبات، أو الفشل الكلوي أو قصور الكبد.

يموت ما بين خمسة وعشرة في المائة من مرضى المكورات السحائية، في بعض الأحيان حتى مع العلاج المبكر.

لماذا يتعين عليكم الحصول على اللقاح؟

يعتبر مرض المكورات السحائية نادراً ولكنه خطير للغاية ويمكن أن يصبح مهدداً للحياة بسرعة.

يوفر لقاح المكورات السحائية (ACWY) الوقاية من أربعة أنواع من مرض المكورات السحائية، بما في ذلك نوعان باتا أكثر شيوعاً في أستراليا في السنوات الأخيرة، بفعل بكتيريا من نوع W و Y.

يوجد لقاح منفصل يقي من المكورات السحائية من النوع B. يمكنك التحدث إلى طبيبك أو الجهة الأخرى التي تُعنى بتزويد اللقاح للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا اللقاح.

تكرار جرعات لقاح المكورات السحائية

إذا تلقى شخص مؤهل جرعة من لقاح المكورات السحائية C في مرحلة الطفولة، فإنه لا يزال من المستحسن أن يتلقى لقاح المكورات السحائية (ACWY) في سن المراهقة. يوفر لقاح المكورات السحائية (ACWY) الوقاية من أنواع A، W، Y، بالإضافة إلى تعزيز المناعة ضد النوع C.

كيف تحصل على اللقاح؟

اللقاح مجاني لجميع الطلاب في الصف العاشر الذين تتراوح أعمارهم بين 14-16 سنة من خلال برامج التحصين في المدارس. حتى إذا كان عمر طفلك يتراوح بين 14 و 16 عاماً، فلن يُعطى اللقاح في المدرسة إذا لم يكن في مستوى السنة المؤهلة لتلقي اللقاح.

سوف يتلقى الطلاب في مستوى السنة المؤهلة لتلقي اللقاح على استمارة موافقة من مدرستهم. يجب توقيع استمارة الموافقة من قبل أحد الوالدين أو الوصي وإعادته إلى المدرسة قبل إعطاء اللقاح.

يمكن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة، والذين لم يتلقوا اللقاح في المدرسة، الحصول عليه من خلال طبيبيهم العام أو الجهة الأخرى المعنية بتقديم اللقاح.

كيف يمكنني معرفة ما إذا تم تلقيح طفلي؟

يحتفظ سجل التلقيح الأسترالي بسجل اللقاحات التي أعطيت في أستراليا.

يمكن لأولياء الأمور أو الأوصياء على الأطفال ممن هم دون سن 14 عاماً الوصول إلى كشف تاريخ اللقاحات السابقة لأطفالهم في أي وقت باستخدام الحساب الخاص بكم على Medicare عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي: myGov (my.gov.au).

يمكن للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أكثر الاطلاع على كشف تاريخ اللقاحات الخاصة بهم، أو إعطاء دائرة الخدمات الإنسانية الإذن لتوفير لكم الوصول إلى كشفهم.

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

✓ تحدث إلى طبيبك العام أو الجهة الأخرى المعنية بتزويد اللقاح.

✓ health.gov.au/immunisation