

疫苗的效果如何？

接種腦膜炎雙球菌疫苗可以幫助青少年免受腦膜炎雙球菌感染，是一種安全有效的保護方法。

一劑的腦膜炎雙球菌ACWY型疫苗能針對這四類型腦膜炎雙球菌，提供非常有效的保護。

疫苗安全嗎？

腦膜炎雙球菌疫苗非常安全。英國與美國已分別自2015年和2005年起，在其國內施行青少年腦膜炎雙球菌ACWY型疫苗接種計劃。

與所有疫苗一樣，接種後有些人可能會有反應。

這些反應通常溫和，可能包括：

- ✓ 注射部位疼痛、腫脹或發紅
- ✓ 頭痛、疲勞和發燒
- ✓ 噁心和食慾下降

對疫苗出現嚴重副作用極為罕見。

若您擔心孩子的反應，請尋求醫療建議。

青少年腦膜炎 雙球菌 ACWY 型疫苗

您可以瀏覽治療用品管理局（Therapeutic Goods Administration，簡稱TGA）網站：tga.gov.au，以了解更多有關腦膜炎雙球菌疫苗的安全資料。

health.gov.au/immunisation

青少年腦膜炎 雙球菌ACWY 型疫苗

腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，但您可以預防。



health.gov.au/immunisation

青少年腦膜炎 雙球菌 ACWY 型疫苗

什麼是腦膜炎雙球菌感染？

腦膜炎雙球菌感染是指由常見於鼻或喉中的腦膜炎雙球菌入侵身體而導致的嚴重疾病。

年齡較大的青少年和年青的成年人最有可能是帶菌者，並將其傳播給其他人。

腦膜炎雙球菌有許多不同類型。全球引致腦膜炎雙球菌感染的主要類型是A、B、C、W和Y型。

腦膜炎雙球菌感染的症狀包括發燒、頭痛、嘔吐、頸部僵硬或肌肉酸痛，有時還會出現紅色或紫色皮疹。

此疾病可引致併發症，包括截肢、失聰和失明、疤痕，以及腎臟或肝臟衰竭，而導致永久殘疾。

腦膜炎雙球菌感染患者的死亡率為5%至10%，有時甚至包括已接受早期治療的患者。

為甚麼要接種疫苗？

腦膜炎雙球菌感染很罕見但非常嚴重，會迅速危及生命。

腦膜炎雙球菌ACWY型疫苗提供針對四類型腦膜炎雙球菌感染的保護，包括近年在澳洲較普遍由W型和Y型細菌引起的感染。

另外有一種單一疫苗可以預防B型腦膜炎雙球菌感染。聯絡您的家庭醫生或其他疫苗接種提供者，以了解更多有關此疫苗的資料。

重覆接種腦膜炎雙球菌疫苗

合資格人士若在兒童時已接種腦膜炎雙球菌C型疫苗，我們仍建議在青少年時期接種腦膜炎雙球菌ACWY型疫苗。

腦膜炎雙球菌ACWY型疫苗提供針對A、W、Y類型細菌的保護，並且可以加強對C型細菌的免疫力。

如何可以接種疫苗？

通過學校免疫計劃，所有14至16歲的10年級學生都可以免費接種疫苗。即使您的孩子年齡在14-16歲之間，若他們就讀的年級不符合資格，他們也不能在校內獲接種疫苗。

就讀合資格年級的學生將收到學校的接種同意書。此同意書必須由家長或監護人簽署，並在疫苗接種前將同意書交回學校。

年齡介乎15至19歲且未曾在學校接種疫苗的青少年可以通過其家庭醫生或其他疫苗接種提供者接種疫苗。

我怎樣能知道我的孩子曾否接種疫苗？

澳洲免疫登記處（Australian Immunisation Register）記錄了澳洲的疫苗接種記錄。

14歲以下兒童的父母或監護人可以通過myGov（my.gov.au）使用您的Medicare在線帳戶隨時取得子女的免疫記錄報告單。

14歲或以上的青少年可以查看他們自己的免疫記錄報告單，或授權民政部(Department of Human Services)讓父母或監護人取得他們的記錄報告單。

我在何處可取得更多信息？

- ✓ 聯絡您的家庭醫生或其他疫苗接種提供者。
- ✓ health.gov.au/immunisation