



โควิด-19: การระบุนาการ

อาการ		โควิด-19	โรคหวัด	โรคไขหวัดใหญ่	โรคนูมิแพ้*
		อาการเล็กน้อยถึงรุนแรง	ค่อย ๆ แสดงอาการ	แสดงอาการอย่างฉับพลัน	แสดงอาการอย่างฉับพลันหรือค่อย ๆ แสดงอาการ
ไข้		พบได้ทั่วไป	พบได้ยาก	พบได้ทั่วไป	ไม่ปรากฏ
ไอ		พบได้ทั่วไป	พบได้ทั่วไป	พบได้ทั่วไป	พบได้ทั่วไป (โรคหอบหืด)
เจ็บคอ		บางครั้ง	พบได้ทั่วไป	บางครั้ง	บางครั้ง (คันคอและเพดานปาก)
หายใจขัด		บางครั้ง	ไม่ปรากฏ	ไม่ปรากฏ	พบได้ทั่วไป (โรคหอบหืด)
เหนื่อยล้า		บางครั้ง	บางครั้ง	พบได้ทั่วไป	บางครั้ง
ปวดตามร่างกาย		บางครั้ง	ไม่ปรากฏ	พบได้ทั่วไป	ไม่ปรากฏ
ปวดศีรษะ		บางครั้ง	พบได้ทั่วไป	พบได้ทั่วไป	บางครั้ง
น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก		บางครั้ง	พบได้ทั่วไป	บางครั้ง	พบได้ทั่วไป
ท้องเสีย		พบได้ยาก	ไม่ปรากฏ	บางครั้ง โดยเฉพาะเด็ก	ไม่ปรากฏ
จาม		ไม่ปรากฏ	พบได้ทั่วไป	ไม่ปรากฏ	พบได้ทั่วไป

คัดแปลงจากข้อมูลซึ่งผลิตโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งองค์การอนามัยโลกและสถาบันโรคนูมิแพ้ โรคหอบหืด และนุมิคุ้มกันวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา โรคนูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจรวมถึงอาการจุกอกแสบจากนุมิแพ้ (ไข้ละอองฟาง) และนุมิแพ้ที่เกิดจากโรคหอบหืด อาการทั่วไปอื่น ๆ ของไข้ละอองฟางรวมถึงอาการคันจมูก คันตาและน้ำตาไหล การแยกแยะอาการของโรคโควิด-19 โรคไขหวัดใหญ่ และโรคหวัดธรรมดาทำได้ยากมาก หากคุณมีอาการติดเชื้อหรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใด ๆ (เช่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีไข้ หายใจขัด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ หรือน้ำมูกไหล) ห้ามไปทำงาน คุณต้องกักตัวแยกจากผู้อื่นและให้บุคลากรทางการแพทย์วินิจฉัยโรค คุณอาจต้องตรวจโรคโควิด-19 ห้ามมิให้คุณกลับไปทำงานจนกว่าจะได้รับอนุญาตโดยแพทย์ คุณต้องตรวจให้แน่ใจว่าคนที่อยู่ในความดูแลของคุณได้รับการปกป้องและปลอดภัย ผู้ที่มีอาการโรคนูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการจุกอกแสบจากโรคนูมิแพ้ (ไข้ละอองฟาง) และนุมิแพ้ที่เกิดจากโรคหอบหืดควรอยู่บ้านและไปตรวจโควิด-19 เมื่อรู้สึกว่ามีอาการของโรคนูมิแพ้เหล่านี้และหากพวกเขามีอาการแบบไม่คาดคิดแตกต่างหรือแย่กว่าปกติหรือกินยาที่ใช้เป็นประจำแล้วไม่ดีขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไปที่ [health.gov.au](https://www.health.gov.au) เข้าไปที่ www.health.gov.au/resources/translated หรือ โทร 131 450 เพื่อขอใช้บริการแปลและล่าม