



Australian Government



# После вакцинации от COVID-19 - Pfizer

## О вакцине

Сегодня вы получили дозу **вакцины Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)**.

Эта вакцина может предотвратить заражение людей COVID-19. Вакцина Comirnaty не содержит живых вирусов и не может заразить вас COVID-19. Она содержит генетический код важной части вируса SARS-CoV-2, называемой шиповидным белком. После вакцинации ваш организм создаст копии шиповидного белка. Затем ваша иммунная система научится распознавать вирус SARS-CoV-2 и бороться с ним. Генетический код быстро расщепляется организмом.

## Чего ожидать после вакцинации

Как и в случае с любой другой вакциной, у вас могут возникнуть некоторые побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.

**Обычные** побочные эффекты после вакцины **Comirnaty** включают:

- боль или припухлость в месте инъекции
- чувство усталости
- головную боль
- боли в мышцах
- повышенную температуру и озноб
- боли в суставах.

**Менее распространенные** побочные эффекты после вакцины **Comirnaty** включают:

- покраснение в месте укола
- тошнота
- увеличенные лимфатические узлы
- плохое самочувствие
- боль в конечности
- бессонница
- зуд в месте укола.

Эти побочные эффекты обычно протекают легко и проходят в течение одного-двух дней. У некоторых людей после вакцинации появятся симптомы гриппа, которые более значительными по сравнению с симптомами, появляющимися после получения других распространенных вакцин, и таким людям, возможно, на какое-то время придется отказаться от своих обычных занятий. Такие симптомы могут появиться после приема каждой дозы, но чаще встречаются после второй дозы.

Если после вакцинации вы испытываете боль в месте инъекции или жар, головные боли или ломоту в теле, вы можете принять парацетамол или ибупрофен. Эти лекарства помогут смягчить вышеуказанные симптомы (вам не нужно принимать парацетамол или ибупрофен перед вакцинацией). Если в месте укола появилась припухлость, можно использовать холодный компресс.

**Редкие** побочные эффекты, о которых сообщалось после введения вакцины **Comirnaty**:

- Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия)

Вам следует обратиться за медицинской помощью после вакцинации, если:

- вы думаете, что у вас возникла аллергическая реакция. Позвоните по номеру 000, если вы испытываете серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание, хрипы, учащенное сердцебиение или обморочное состояние.
- вы беспокоитесь о возможном побочном эффекте или появлении новых или неожиданных симптомов.
- у вас наблюдается ожидаемый побочный эффект от вакцины, но он не прошел в течение нескольких дней.

В случае несрочных симптомов вы можете обратиться к своему постоянному врачу (обычно к терапевту).

## Мониторинг безопасности вакцин и сообщение о побочных эффектах

Вы можете сообщить о предполагаемых побочных эффектах своему провайдеру вакцинации или другому медицинскому работнику. Затем они от вашего имени направят официальный отчет в департамент здравоохранения вашего штата или территории или непосредственно в Управление терапевтических товаров (Therapeutic Goods Administration - TGA).

Если вы предпочитаете сообщить об этом самостоятельно, пожалуйста, посетите [интернет-страницу сообщений о предполагаемых побочных эффектах, связанных с вакциной против COVID-19](#) на веб-сайте TGA и следуйте инструкциям на этой странице.

## Тест на COVID-19 после вакцинации

Некоторые побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 могут быть похожи на симптомы COVID-19 (например, повышенная температура), хотя вакцина Comirnaty не содержит живых вирусов и не может вызывать COVID-19. Вам может не понадобиться проходить тест на COVID-19 или изолироваться:

- если у вас появятся обычные симптомы, такие как повышенная температура, головная боль или усталость в первые два дня после вакцинации, и
- если вы уверены, что у вас нет респираторных симптомов (таких как насморк, кашель, боль в горле, потеря обоняния или потеря вкуса).

Тем не менее, вам следует проверить действующие правила в вашем штате / территории для получения самой последней информации. Этот совет может измениться в случае вспышки COVID-19 в вашем районе. Вам все равно может потребоваться пройти тест на COVID-19, если вы соответствуете другим критериям, например, вы близко контактировали с известным случаем COVID-19. В случае сомнений обратитесь к врачу.

## **Не забудьте о времени, назначенном вам для повторной прививки**

Важно, чтобы вы получили две дозы вакцины Comirnaty (Pfizer) с интервалом продолжительностью не менее трех недель. Вторая доза может продлить срок защиты от COVID-19.

## **Как используется информация, которую вы предоставляете на приеме**

Для получения информации о том, как ваши личные данные собираются, хранятся и используются, посетите сайт <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>