



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

Sau khi tiêm vắc-xin

Tác dụng phụ là gì?



Sau khi tiêm vắc-xin, quý vị có thể cảm nhận một số **tác dụng phụ**.

Một tác dụng phụ là điều đôi khi có thể xảy ra với chúng ta sau khi uống thuốc.

Tác dụng phụ không xảy ra với tất cả mọi người.



Hầu hết các tác dụng phụ sẽ không làm cho quý vị bị bệnh nặng. Chúng tôi gọi đây là các **tác dụng phụ thường gặp**.

Nhưng một số tác dụng phụ có thể trầm trọng.

Các tác dụng phụ này **cực kỳ hiếm xảy ra**.

Các tác dụng phụ



Hầu hết các tác dụng phụ:

- không trầm trọng
- tự khỏi trong 1 đến 2 ngày.

Một số tác dụng phụ **thường gặp** là:



- đau hoặc sưng ở cánh tay nơi vết chích
- đau cơ hoặc khớp
- mệt mỏi
- đau đầu
- ớn lạnh.



Tác dụng phụ **hiếm xảy ra** bao gồm:

- đỏ hoặc ngứa ở cánh tay nơi vết chích
- cảm thấy muốn nôn mửa
- cảm thấy đau trong dạ dày



- cục u ở cổ
- đau ở chân
- không ngủ ngon.

Phản ứng dị ứng



Một số người có thể bị **phản ứng dị ứng** với vắc-xin COVID-19.

Phản ứng dị ứng là khi cơ thể quý vị phản ứng với một cái gì đó, chẳng hạn như thực phẩm hoặc thuốc men. Ví dụ, quý vị có thể bị phát ban ngứa hoặc lưỡi của quý vị có thể lớn hơn.

Tác dụng phụ hiếm xảy ra nhưng trầm trọng



Các tác dụng phụ trầm trọng bao gồm:

- buồn nôn hoặc nôn mửa
- khó thở




- **thờ khò khè** - có nghĩa là quý vị phát ra âm thanh mà thường quý vị không nghe thấy khi thở
- cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh
- đau ở chân
- ngã quỵ hoặc ngất xỉu.

Tác dụng phụ trầm trọng nhưng hiếm xảy ra: Máu đông cục



Một tác dụng phụ trầm trọng khác là máu đông cục. Khi máu sệt hơn và dính vào nhau, chúng ta gọi là máu đông cục.



Tình trạng hiếm xảy ra này có thể gây ra khuyết tật dài hạn trầm trọng hoặc tử vong. Nhưng có thể điều trị hiệu quả máu đông cục.

Các triệu chứng của tác dụng phụ hiếm xảy ra này có thể bao gồm:



- bị đau đầu rất nặng:
 - bắt đầu ít nhất là 4 ngày sau khi quý vị tiêm vắc-xin
 - không thuyên giảm khi quý vị uống thuốc giảm đau
 - trở nên nặng hơn khi nằm nghỉ.




- mắt mờ
- cảm thấy khó nói
- co giật



- đau ở ngực hoặc chân



- đau ở bụng mà không hết



- các đốm nhỏ dưới da không gần vết chích ở cánh tay quý vị.

Quý vị nên làm gì nếu bị tác dụng phụ?



Nếu bị bất kỳ tác **dụng phụ trầm trọng** nào hoặc phản ứng dị ứng **nặng** nào liệt kê ở trên sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, quý vị nên gọi xe cứu thương qua số 000 ngay lập tức.



Nếu có tác dụng phụ **phổ biến** nào làm quý vị khó chịu, quý vị có thể uống thuốc giảm đau.

Loại thuốc giảm đau thông thường như paracetamol hoặc ibuprofen có thể phù hợp cho quý vị.



Hỏi bác sĩ trước khi quý vị uống bất kỳ loại thuốc giảm đau nào khác.



Quý vị cũng có thể sử dụng túi lạnh chườm vết chích trên cánh tay của mình.



Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ nếu quý vị:

- lo lắng về tác dụng phụ
- bị phản ứng dị ứng
- bị tác dụng phụ kéo dài hơn từ 1 đến 2 ngày
- bị tác dụng phụ bắt đầu từ 4 đến 28 ngày sau khi tiêm vắc-xin
- bị các tác dụng phụ không nêu trong tờ thông tin này.

Quý vị có cần xét nghiệm COVID-19 sau khi tiêm chủng không?



Một số tác dụng phụ của việc chủng ngừa tương tự như các **triệu chứng** của COVID-19. Triệu chứng là dấu hiệu cho thấy quý vị có thể bị bệnh.



Một số người vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 sau khi chủng ngừa.



Quý vị nên đi xét nghiệm COVID-19 nếu bị bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào, bao gồm:

- sốt
- mệt mỏi



- đau họng
- ho
- hụt hơi
- không còn biết vị
- không còn biết mùi.



Quý vị cũng có thể cần đi xét nghiệm COVID-19 nếu:

- người mà quý vị đã gặp gần đây bị nhiễm COVID-19
- quý vị sống tại tiểu bang hoặc lãnh thổ có rất nhiều trường hợp nhiễm COVID-19.



Nếu không chắc chắn, quý vị nên nói chuyện với bác sĩ của mình.

Để biết thêm thông tin



Quý vị có thể truy cập trang web của Bộ Y Tế qua www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages để biết thêm thông tin về vắc-xin bằng ngôn ngữ của quý vị.



Quý vị có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp Toàn quốc về Coronavirus qua số **1800 020 080**.

Nếu quý vị cần thông tin bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, hãy gọi cho Dịch vụ Thông và Phiên dịch qua số **131 450**.