



Informacije o AstraZeneca cjepivu

AstraZeneca cjepivo

Postoji veza između AstraZeneca cjepiva i rijetkog stanja, koje uključuje stvaranje krvnih ugrušaka i nisku razinu trombocita. To stanje se zove sindrom tromboze s trombocitopenijom (TTS).

Cijepljenje protiv COVID-19 se preporučuje svim odraslim osobama. Pfizer cjepivo je poželjno cjepivo protiv COVID-19 za odrasle osobe mlađe od 60 godina. Međutim, odrasle osobe mlađe od 60 godina mogu i dalje odabrati AstraZeneca cjepivo. Razgovarajte s vašim liječnikom kako biste donijeli odluku.

AstraZeneca cjepivo će se davati osobama starijim od 60 godina.

Što je sindrom tromboze s trombocitopenijom (poznat kao TTS)?

Tromboza znači zgrušavanje krvi.

Trombocitopenija označava nisku razinu trombocita.

TTS je vrlo rijetka, potencijalna nuspojava AstraZeneca cjepiva. Ako se dogodi, može biti ozbiljna i prouzročiti invaliditet ili smrt. TTS izaziva stvaranje ugrušaka krvi koji se mogu pojaviti u različitim dijelovima tijela. Također može uzrokovati i nisku razinu trombocita, što može dovesti do krvarenja.

Kada se javlja TTS?

Prijavljeni slučajevi TTS-a su se javili između 4 do 42 dana nakon cijepljenja, obično nakon prve doze AstraZeneca cjepiva.

Koliko je čest TTS?

TTS je rijedak. Prema trenutačnim procjenama, TTS se javlja kod jedne do dvije osobe na svakih 100,000 osoba koje prime AstraZeneca cjepivo protiv COVID-19. Za osobe mlađe od 60 godina, procijenjena stopa je veća - TTS se javlja kod dvije do tri osobe na svakih 100.000 cijepljenih osoba. Ove procjene će se ažurirati kada budemo imali više informacija.

Jesu li neke skupine stanovništva pod većim rizikom od TTS-a?

Čini se da se TTS češće javlja kod mlađih odraslih osoba, iako je prijavljen i kod nekih starijih odraslih osoba. Ne znamo je li postojeća oboljenja / medicinska stanja doprinose zgrušavanju krvi. Istraživači to još uvijek istražuju.

Koji su simptomi TTS-a?

TTS može uzrokovati neke od sljedećih simptoma:

- jaku glavobolju koja se:
 - javlja najmanje dva dana *nakon* cijepljenja
 - ne prolazi od običnih lijekova protiv bolova
 - može se pogoršati kada se leži
- mučninu i povraćanje
- zamagljen vid
- otežan govor
- pospanost
- epileptične napadaje
- otežano disanje
- bol u prsima
- oticanje nogu
- stalne bolove u trbuhu
- potkožno krvarenje u vidu sitnih točkica koje nisu na mjestu ubrizgavanja injekcije.

Ako vi ili netko drugi dobijete bilo koju od ovih ozbiljnih nuspojava nakon cijepljenja protiv COVID-19, odmah nazovite 000.

Jesu li koristi AstraZeneca cjepiva veće od rizika?

Da. Prednosti cijepljenja su veće od rizika, osobito kod starijih osoba kod kojih je rizik od obolijevanja od COVID-19 veći.

Što ako ste mlađi od 60 godina i zakazali ste termin za prvu dozu AstraZeneca cjepiva?

Ako ste zakazali termin za prvu dozu AstraZeneca cjepiva, a mlađi ste od 60 godina, razgovarajte s vašim liječnikom i on će vam pomoći da odlučite trebate li primiti to cjepivo.

Što ako ste primili prvu dozu AstraZeneca cjepiva i trebate primiti drugu dozu?

Gotovo svi prijavljeni slučajevi TTS-a su nastali nakon prve doze AstraZeneca cjepiva protiv COVID-19. Ako niste imali ozbiljnih nuspojava nakon prve doze AstraZeneca cjepiva, možete slobodno primiti i drugu dozu, čak i ako ste mlađi od 60 godina.

Je li AstraZeneca cjepivo sigurno za osobe koje su u prošlosti imali krvne ugruške?

Ako ste u prošlosti imali druge vrste krvnih ugrušaka ili ste pod rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka, vi i pored toga možete primiti AstraZeneca cjepivo. Nema dokaza da prethodni krvni ugrušak povećava rizik od TTS-a nakon AstraZeneca cjepiva.

Daljnje informacije

Ako imate pitanja o AstraZeneca cjepivu, obratite se liječniku, posjetite www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages ili nazovite dežurnu telefonsku službu za pitanja o koronavirusu (National Coronavirus Helpline) na 1800 020 080. Za usluge prevođenja i tumačenja, nazovite 131 450.