



Australian Government



Trudnoća, dojenje i cjepiva protiv COVID-19

Trudnicama, dojiljama i ženama koje planiraju trudnoću se preporuča primiti Comirnaty (Pfizer) ili Spikevax (Moderna) cjepivo. Trudnice se mogu cijepiti u bilo kojem stadiju trudnoće.

Rizik od ozbiljnih negativnih posljedica od COVID-19 je veći kod trudnica i njihovih nerođenih beba. Trudnice koje se zaraze s COVID-19 su pod većim rizikom od hospitalizacije i potrebe za intenzivnom njegom. Njihove nerođene bebe će biti pod nešto većim rizikom da će se roditi prijevremeno (prije 37 tjedana trudnoće) i trebati bolničko liječenje.

Cijepljenje predstavlja najbolji način za smanjenje tih rizika. Trebat ćete primiti dvije doze Pfizer cjepiva, u razmaku od tri do šest tjedana ili dvije doze Moderna cjepiva, u razmaku od četiri do šest tjedana.

Studija provedena u SAD-u u kojoj je sudjelovalo više od 35.000 trudnica je pokazala da su nuspojave cijepljenja vrlo slične i kod trudnih žena i kod onih koje to nisu. Nakon cijepljenja se ne povećava vjerojatnost komplikacija, na primjer da će se beba roditi prijevremeno, mrtvorodeno, da će imati manju tjelesnu težinu za svoju gestacijsku dob ili urođene anomalije.

Preporuke ćemo ažurirati kako budemo dobivali više podataka o cijepljenju trudnica protiv COVID-19.

Koje su moguće nuspojave cjepiva protiv COVID-19 kod trudnica?

Uobičajene nuspojave nakon cijepljenja protiv COVID-19 uključuju:

- vrućicu
- bol u nadlaktici
- glavobolju
- bolove u mišićima
- bolove u zglobovima
- zimicu.

Ako dobijete neku od ovih nuspojava nakon cijepljenja, možete uzeti paracetamol za smanjenje intenziteta tih uobičajenih nuspojava. Paracetamol je siguran u svim stadijima trudnoće.

Studije provedene diljem svijeta nisu otkrile nuspojave koje su specifične za trudnice ili njihove bebe. Međutim, moguće je da postoje vrlo rijetke nuspojave koje istraživači još nisu otkrili.

Postoje li koristi za bebu od cijepljenja protiv COVID-19 tijekom trudnoće?

Trudnice koje imaju COVID-19 su pod većim rizikom da će roditi mrtvorođeno dijete ili da će se poroditi prijevremeno (ranije). Kod njihovih beba je vjerojatnije da će nastati distres tijekom poroda ili da će trebati intenzivnu njegu u bolnici.

Cijepljenje predstavlja najbolji način za smanjenje tih rizika.

Znanstveni dokazi pokazuju da antitijela koja stvaraju trudne žene nakon cijepljenja protiv COVID-19 mogu prijeći preko placente (posteljice) u bebu, osobito ako se trudnice cijepu u ranijim stadijima trudnoće i prime obije doze prije rođenja bebe. Ta antitijela mogu bebi pružiti određeni stupanj zaštite od COVID-19 u prvih nekoliko mjeseci života.

Što se preporuča dojiljama?

Dojiljama se preporučuju Pfizer i Moderna cjepiva. Možete slobodno doći i prije i poslije cijepljenja.

Što se preporuča ženama koje planiraju trudnoću?

Ženama koje planiraju trudnoću se također preporučuju Pfizer i Moderna cjepiva. Cijepljenje prije začeća znači da ćete vjerojatno tijekom cijele trudnoće biti zaštićeni od COVID-19.

Napomena:

- Ne morate izbjegavati začeće ni prije, ni poslije cijepljenja protiv COVID-19.
- Cijepljenje ne utječe na plodnost.
- Ne trebate se testirati na trudnoću prije cijepljenja.

Za daljnje informacije

Kako biste saznali gdje se možete cijepiti protiv COVID-19, posjetite <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>

Ako imate pitanja o cjevivima protiv COVID-19, razgovarajte s liječnikom, posjetite health.gov.au/covid19-vaccines-languages ili nazovite dežurnu telefonsku službu za pitanja o koronavirusu (National Coronavirus Helpline) na 1800 020 080.



Za usluge tumačenja, nazovite 131 450.