



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

接種 COVID-19 疫苗後

2022 年 6 月 17 日

甚麼是副作用？



接種疫苗後，您可能會有一些副作用。
副作用是在服藥後有時會出現的事情。
不是每個人都會有副作用。



大多數副作用不會使您感到不分不適。
然而有些副作用可以很嚴重。
這些副作用極為罕見。

COVID-19 疫苗的副作用



COVID-19 疫苗的大多數副作用：

- 並不嚴重
- 1 至 2 天後會自行消退。

一些常見副作用包括：



- 打針的手臂部位疼痛或腫脹
- 發燒
- 肌肉或關節酸痛
- 疲倦
- 頭痛
- 發冷。



罕見副作用包括：

- 打針的手臂部位紅或痕癢
- 感覺想嘔吐
- 胃部不適



- 頸出現腫塊
- 腿部疼痛
- 睡眠不佳。

過敏反應



有些人可能會對 COVID-19 疫苗有**過敏反應**。

過敏反應是您的身體對某些東西（如食物或藥物）產生反應。例如，您可能會有痕癢紅疹或您的舌頭可能會變大。

嚴重而罕見副作用




嚴重副作用包括：

- 感到不適或嘔吐
- 呼吸困難




- **喘鳴**——是指當您呼吸時發出平常聽不到的聲音
- 感到心跳急促
- 腿部疼痛
- 跌倒或昏厥。

嚴重而罕見副作用：血栓



另一種嚴重副作用是血栓。當血液變濃稠並凝聚在一起時，我們稱之為血栓。



此罕見情況可以導致嚴重的長期殘疾或死亡。但是血栓可以有效治療。

此罕見副作用的症狀可以包括：



- 非常嚴重的頭痛，並有以下情況：
 - 在您接種疫苗後至少 4 天後才出現頭痛
 - 吃止痛藥後仍不能舒緩
 - 躺下時感覺更差。




- 視力模糊
- 感到說話困難
- 癲癇發作。



- 胸口或腿部疼痛



- 持續胃痛不會消退



- 皮下出現小斑點，但不接近手臂注射部位。

若您感到有副作用，應該怎麼辦？



若您在接種 COVID-19 疫苗後出現任何此等**嚴重副作用**或**嚴重過敏反應**，您應該立即致電 000 叫救護車。



若您有任何困擾您的常見副作用，您可以服用止痛藥。

撲熱息痛(paracetamol)或布洛芬(ibuprofen)等簡單止痛藥可能對您有用。



在服用任何其他類型的止痛藥之前，請向您的醫生查詢。



您也可以在手臂注射部位使用冷敷墊。



若您有以下情況，請諮詢您的醫生：

- 您擔心某一種副作用
- 您有過敏反應
- 副作用持續超過 1 至 2 天
- 接種疫苗後 4 至 42 天開始出現副作用
- 有本資料便覽沒有提及的副作用。

接種疫苗後是否需要 COVID-19 檢測？



接種疫苗的一些副作用與患上 COVID-19 症狀相同。有症狀是您可能生病的跡象。



有些人在接種疫苗後仍可能會感染 COVID-19。



若您有任何 COVID-19 症狀，您應該接受 COVID-19 檢測，包括：

- 發燒
- 疲倦



- 咽喉痛
- 咳嗽
- 氣促
- 失去味覺
- 失去嗅覺。



若您最近見過的人患有 COVID-19，您可能仍需要接受 COVID-19 檢測。



若您不肯定，您應該諮詢您的醫生或致電 National Coronavirus Helpline（國家冠狀病毒求助熱線），電話：1800 020 080。選擇選項 8 取得免費傳譯服務。

更多資料



您可以瀏覽衛生部網站 www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages 以您的語言了解有關疫苗的更多資料。



您可以致電 National Coronavirus Helpline（國家冠狀病毒求助熱線），電話：1800 020 080。選擇選項 8 取得免費傳譯服務。