

ပိုးအမြန်စစ်ဆေးနည်း (RAT)

မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးရန် ပိုးအမြန်စစ်ဆေးနည်းကို အသုံးပြုပုံ

ပိုးအမြန်စစ်ဆေးနည်း အားလုံးအတွက် သင် အမြဲလုပ်သင့်သည်မှာ-

- စစ်ဆေးနည်းမှာ သက်တမ်း မကုန်ဆုံးသေးကြောင်း စိစစ်ပါ
- မစစ်ဆေးမီနှင့် စစ်ဆေးပြီးနောက် သင့်လက်များကို ဆေးကြောပါ သို့မဟုတ် ပိုးသတ်သန့်စင်ပါ
- စစ်ဆေးနည်းအထုပ်ပါ စစ်ဆေးနည်းညွှန်ကြားချက်များကို အသေအချာ လိုက်နာပါ



သင် လုပ်သင့်သည့်အရာနှင့် မလုပ်သင့်သည့်အရာ



တံတွေး သို့မဟုတ် သွားရည်ကို
အသုံးပြုရသော စစ်ဆေးနည်းများ
သင် မစစ်ဆေးမီ မိနစ် ၃၀ တွင်-



မစားပါနှင့်



ဆေးလိပ်မ
သောက်ပါနှင့်



သွားမတိုက်
ပါနှင့်



ပီကေ မဝါးပါနှင့်



သင် မစစ်ဆေးမီလေးတွင် နှာခေါင်းစည်းထဲသို့
သို့မဟုတ် တစ်ရှူးထဲသို့ ချောင်းခပ်ကြမ်းကြမ်း
3 ခါမှ 5 ခါ ချောင်းဆိုးပြီး အခြားလူများနှင့်
ဝေးဝေးနေပါ။



သင့်နှာခေါင်းတွင်းမှ အရည်နမူနာကို
အသုံးပြုသည့် စစ်ဆေးနည်းများ



သင် မစစ်ဆေးမီ
နှပ်ညှစ်ပါ



တို့ဖတ်လို့ခေါ်သည့်
အတံငယ်အဖျားရှိ
ပျော့ညံ့သောအဖျားကို
မထိပါနှင့်။

စစ်ဆေးနည်းတစ်ခုကို
တစ်ကြိမ်သာ သုံးနိုင်ကြောင်း
မှတ်ထားပါ။



ပိုးအမြန်စစ်ဆေးနည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ပိုမိုသိရှိရန်
National Coronavirus Helpline ဖုန်း: 1800 020 080

ကိုဆက်သွယ်ပါ

အခမဲ့ စကားပြန်အကူအညီအတွက် နံပါတ် 8 ကို နှိပ်ပါ။

သင့်အနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်- **health.gov.au** တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်သည်။



Australian Government