

# Prueba rápida de antígenos (RAT)

## Cómo utilizar correctamente una prueba rápida de antígenos

Con todas las pruebas rápidas de antígenos, siempre debe:

- Comprobar que la prueba no haya caducado
- Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de realizar la prueba
- Seguir cuidadosamente las instrucciones de la prueba suministradas en el paquete.



## Lo que debe y no debe hacerse



### Pruebas que usan esputo o saliva

30 minutos antes de realizar una prueba, no debe:



Comer



Fumar



Cepillarse los dientes



Masticar goma de mascar



Justo antes de hacerse la prueba, tosa profundamente de 3 a 5 veces con una mascarilla o pañuelo desechable y lejos de otras personas.



### Pruebas que usan una muestra de secreciones de su nariz



Suéñese la nariz antes de hacer la prueba.



No toque el extremo blando del palito, conocido como hisopo.

Recuerde que cada prueba sólo puede ser usada una vez.



Para obtener más información sobre las pruebas rápidas de antígenos, llame a la **National Coronavirus Helpline: 1800 020 080**

Seleccione la opción 8 para obtener asistencia de interpretación gratuita.

También puede visitar [health.gov.au](https://www.health.gov.au)



Australian Government