



Australian Government

COVID-19  
VACCINATION

# COVID-19 ワクチン 4 回目接種

2022 年 7 月 8 日

COVID-19 などの呼吸器系の病気は冬に多くなります。COVID-19 に対する免疫を高めるため、COVID-19 にかかると重症化する危険性の高い人に、追加の COVID-19 ワクチンブースター接種(4 回目接種)を受けることが推奨されています。極度の免疫無防備状態にある人にとっては、5 回目の COVID-19 ワクチン接種となります。

以下が該当する場合は COVID-19 ワクチンの 4 回目接種を受けてください。

- 50 歳以上の人
- 居住型高齢者／身障者介護施設入居者

以下が該当する 16 歳以上の人にも、追加のブースター接種が推奨されています。

- 免疫無防備状態
- 特定のがんにかかっている、もしくはその病歴がある
- 治療を要する自己免疫疾患がある
- 肺、肝臓、腎臓、脳、心臓の慢性または重度の疾患がある
- 糖尿病で薬を飲んでいる
- 相当程度あるいは複雑な治療を要する身体障害がある
- 極度の肥満または低体重。

30～49 歳の人、希望すれば 4 回目接種が受けられます。

4 回目接種を受けるべきかどうか分からないときは、医師に相談してください。

COVID-19 ワクチンの 4 回目接種が受けられるのは、ブースター接種から 3 カ月以上経過している人です。

COVID-19 ワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種できます。

最近 COVID-19 検査で陽性だった人は、次の COVID-19 ワクチン接種まで 3 カ月の間隔をおくことが推奨されます。



より詳しい情報は、[www.health.gov.au](http://www.health.gov.au) のウェブサイト参照するか、National Coronavirus Helpline（電話：1800 020 080）に電話してください。無料通訳サービスを利用するには、オプション 8 を選びます。