



Australian Government

COVID-19  
VACCINATION

# ຢາວັກຊີນ COVID-19 ໂດສ

## ທີສີ່

ວັນທີ 8 ກໍຣະກະດາ 2022

ລະດູໜາວມັກຈະນຳເອົາການຕິດເຊື້ອຈາກໄວຣັສໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈມາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: COVID-19. ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງສູງສຸດຈາກ COVID-19, ຂໍແນະນຳໃຫ້ສັກວັກຊີນບູສເຕີ ຕ້ານເຊື້ອ COVID-19 ເພີ່ມ ຫຼື ໂດສທີ 4 ຂສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຈາກ COVID-19. ນີ້ຈະເປັນການສັກໂດສທີ 5 ສຳລັບຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນປົກປ້ອງຮ້າຍແຮງ.

ທ່ານຄວນສັກວັກຊີນ COVID-19 ໂດສທີສີ່ຖ້າທ່ານ:

- ມີອາຍຸ 50 ປີ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ
- ເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ດູແລຜູ້ສູງອາຍຸຫຼືຄົນພິການ

ການສັກວັກຊີນບູສເຕີເພີ່ມກໍໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ ທີ່:

- ມີພູມຄຸ້ມກັນປົກປ້ອງ
- ມີ ຫຼື ລອດຊີວິດຈາກມະເຮັງບາງຊະນິດ
- ມີ ພະຍາດ ພູມຕ້ານຕົນເອງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
- ມີພະຍາດຊຳເຮື້ອ ຫຼື ຮ້າຍແຮງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປອດ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ສະໝອງ ຫຼື ຫົວໃຈຂອງທ່ານ
- ມີພະຍາດເບົາຫວານທີ່ຕ້ອງກິນຢາ
- ມີຄວາມພິການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສຳຄັນຫຼືສະລັບສັບຊ້ອນ
- ມີນ້ຳໜັກເກີນ ຫຼື ນ້ຳໜັກໜ້ອຍ.

ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 30 ຫາ 49 ປີສາມາດໄດ້ຮັບໂດສທີສີ່ຖ້າພວກເຂົາເລືອກເອົາ.

ເວົ້າລົມກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນບູສເຕີໂດສທີສີ່ ຫຼື ບໍ່.

ທ່ານສາມາດຮັບວັກຊີນຕ້ານ COVID-19 ໂດສທີສີ່ໄດ້ຖ້າວ່າມັນເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ **3 ເດືອນ** ນັບຕັ້ງແຕ່ວັກຊີນ ບູສເຕີຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດຮັບວັກຊີນ COVID-19 ຂອງທ່ານພ້ອມກັນກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄດ້.

ຖ້າທ່ານໄດ້ກວດພົບວ່າມີ COVID-19 ທາງບວກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າ **3 ເດືອນ** ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ໂດສຕໍ່ໄປ.



ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ [www.health.gov.au](http://www.health.gov.au) ຫຼືໂທຫາ National Coronavirus Helpline ທີ່ເລກໂທ 1800 020 080. ໃຫ້ເລືອກທາງເລືອກ 8 ສຳລັບບໍລິການນາຍພາສາຟຣີ.