



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

Четврта доза вакцине против COVID-19

8. јул 2022.

Зими обично има више инфекција које изазивају респираторни вируси, као што је и COVID-19. Да би се стекла максимална заштита од COVID-19, особама код којих постоји већи ризик од озбиљног обољевања од COVID-19 се препоручује додатна бустер доза, тј. четврта доза вакцине против COVID-19. То ће особама које су озбиљно имунокомпромитоване бити пета доза вакцине против COVID-19.

Четврту дозу вакцине против COVID-19 треба да примите ако:

- имате 50 година или сте старији
- станујете у старачком дому или у дому за особе са инвалидитетом

Додатна бустер доза вакцине против COVID-19 се препоручује и особама од 16 година и старијима које:

- су имунопромитоване
- имају или су имале одређене врсте рака
- имају аутоимуноу болест за коју морају да примају третман
- имају хроничну или озбиљну болест, на пример болест плућа, јетре, бубрега, мозга или срца
- имају дијабетес за који морају да узимају лекове
- имају инвалидитет са значајним или сложеним здравственим потребама
- су озбиљно гојазне или неухрањене.

Особе између 30 и 49 година, ако желе, такође могу да приме четврту дозу.

Разговарајте са лекаром ако нисте сигурни да ли треба да примите четврту дозу.

Четврту дозу вакцине против COVID-19 можете да примите ако је прошло најмање **3 месеца** од бустер дозе.

Вакцину против COVID-19 и вакцину против грипа можете да примите истовремено.

Ако сте недавно били позитивни на COVID-19, вама се препоручује да сачекате **3 месеца** пре него што примите следећу дозу вакцине против COVID-19.



За више информација, посетите www.health.gov.au или назовите National Coronavirus Helpline на 1800 020 080. Изаберите опцију бр. 8 за бесплатне преводилачке услуге.