



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

วัคซีน COVID-19 เข็มที่สี่

08 กรกฎาคม 2022

ฤดูหนาวมักจะนำการติดเชื้อจากไวรัสในระบบทางเดินหายใจ เช่น COVID-19 มามากขึ้น เพื่อให้การป้องกัน COVID-19 มากที่สุด จึงมีการแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเจ็บป่วยที่รุนแรงจาก COVID-19 ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มบูสเตอร์เพิ่มเติมหนึ่งเข็มหรือเข็มที่สี่ นี่จะเป็นวัคซีน COVID-19 เข็มที่ห้าสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง

คุณควรฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่สี่หากคุณ:

- อายุ 50 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้อยู่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

นอกจากนี้ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพิ่มเติมหนึ่งเข็มด้วยสำหรับคนอายุ 16 ปีขึ้นไปซึ่ง:

- มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- เป็นหรือได้รอดชีวิตจากการเป็นมะเร็งบางชนิด
- เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของตนเองซึ่งต้องมีการรักษา
- เป็นโรคเรื้อรังหรือร้ายแรงที่มีผลต่อปอด ดับ ไต สมองหรือหัวใจของคุณ
- เป็นเบาหวานที่ต้องใช้ยารักษาโรค
- ทุพพลภาพพร้อมความต้องการด้านสุขภาพที่สำคัญหรือซับซ้อน
- น้ำหนักเกินหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อย่างรุนแรง

คนอายุ 30 ถึง 49 ปีก็สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่สี่ได้ด้วย หากเลือกที่จะฉีด

กรุณาพูดกับแพทย์ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรรับเข็มที่สี่หรือไม่

คุณสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่สี่ได้ หากคุณได้รับเข็มบูสเตอร์ของคุณมาแล้วอย่างน้อย **3 เดือน**

คุณสามารถรับวัคซีน COVID-19 ได้ในเวลาเดียวกันกับวัคซีนไขหวัดใหญ่

หากคุณตรวจ COVID-19 ได้ผลเป็นบวกเมื่อไม่นานมานี้ แนะนำให้คุณรอ **3 เดือน** ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มต่อไปของคุณ



ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.health.gov.au หรือโทรถึง National Coronavirus Helpline
ที่หมายเลข 1800 020 080 กด 8 สำหรับบริการล่ามฟรี