



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

Četvrta doza COVID-19 cjepiva

8. srpnja 2022.

Zimi obično ima više infekcija koje uzroče respiracijski virusi, kao što je i COVID-19. Kako bi se stekla maksimalna zaštita od COVID-19, osobama kod kojih postoji veći rizik od ozbiljnog oboljevanja od COVID-19 se preporuča dodatna docjepna doza, odnosno četvrta doza COVID-19 cjepiva. To će osobama koje su ozbiljno imunokompromitirane biti peta doza COVID-19 cjepiva.

Četvrtu dozu COVID-19 cjepiva trebate primiti ako:

- ste u dobi od 50 godina ili stariji
- stanujete u staračkom domu ili u domu za osobe s invaliditetom

Dodatna docjepna doza COVID-19 cjepiva se preporučuje i osobama u dobi od 16 godina i starijima koje:

- su imunokompromitirane
- imaju ili su imale određene vrste raka
- imaju autoimunosnu bolest za koju moraju primati tretman
- imaju kroničnu ili ozbiljnu bolest, na primjer bolest pluća, jetre, bubrega, mozga ili srca
- imaju dijabetes za koji moraju uzimati lijekove
- imaju invaliditet sa značajnim ili složenim zdravstvenim potrebama
- su ozbiljno pretile ili pothranjene.

Osobe između 30 i 49 godina, ako žele, također mogu primiti četvrtu dozu.

Razgovarajte s liječnikom ako niste sigurni trebate li primiti četvrtu dozu.

Četvrtu dozu COVID-19 cjepiva možete primiti ako je prošlo najmanje **3 mjeseca** od docjepne doze.

COVID-19 cjepivo možete primiti istodobno sa cjepivom protiv gripe.

Ako ste nedavno bili pozitivni na COVID-19, vama se preporuča sačekati **3 mjeseca** prije nego što primite sljedeću dozu COVID-19 cjepiva.



Za daljnje informacije, posjetite www.health.gov.au ili nazovite National Coronavirus Helpline na 1800 020 080. Izaberite opciju br. 8 za besplatne usluge tumačenja.