



Australian Government

COVID-19  
VACCINATION

# Liều vắc-xin COVID-19 thứ tư

Ngày 8 tháng 7 năm 2022

Mùa đông thường có nhiều bệnh do vi-rút đường hô hấp gây ra, như COVID-19. Để đem lại sức đề kháng bảo vệ chống lại COVID-19 hiệu quả nhất, người có nguy cơ dễ bị bệnh nặng do COVID-19 gây ra hơn nên tiêm thêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung hay liều vắc-xin COVID-19 thứ tư. Đối với người bị suy giảm miễn dịch trầm trọng, liều vắc-xin này sẽ là liều vắc-xin COVID-19 thứ năm.

Quý vị nên tiêm liều vắc-xin thứ tư nếu quý vị:

- 50 tuổi trở lên
- cư dân cư xá cao niên hoặc cơ sở chăm sóc người khuyết tật

Người từ 16 tuổi trở lên cũng nên tiêm thêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung nếu:

- bị suy giảm miễn dịch
- bị hoặc từng bị một số loại bệnh ung thư
- bị bệnh tự miễn dịch cần điều trị
- bị bệnh kinh niên hoặc bệnh nặng ảnh hưởng đến phổi, gan, thận, não hoặc tim
- bị tiểu đường cần dùng thuốc
- bị khuyết tật kèm nhu cầu sức khỏe đáng kể hoặc phức tạp
- thừa cân hoặc thiếu cân quá mức.

Người từ 30 đến 49 tuổi cũng có thể tiêm liều thứ tư nếu họ muốn vậy.

Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu không chắc quý vị có nên tiêm liều vắc-xin thứ tư hay không.

Quý vị có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ tư nếu đã được ít nhất **3 tháng** kể từ lần quý vị tiêm vắc-xin bổ sung.

Quý vị có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 cùng lúc với chích ngừa cúm.

Nếu gần đây quý vị đã có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, quý vị nên đợi **3 tháng** rồi hãy tiêm liều vắc-xin COVID-19 kế tiếp.



Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập [www.health.gov.au](http://www.health.gov.au) hoặc gọi cho National Coronavirus Helpline qua số 1800 020 080. Muốn có thông dịch viên miễn phí, hãy bấm số 8.