

常见问题

问：孕妇是否可以免费接种百日咳疫苗？

是的。根据国家免疫计划 (National Immunisation Program)，孕妇可以免费接种该疫苗。

问：如果怀孕时接种疫苗，婴儿还需要接种疫苗吗？

需要。根据国家免疫计划儿童疫苗接种时间表，婴儿仍然需要接种百日咳疫苗。应在婴儿出生后2个月（可从6周开始）、4个月和6个月大时接种百日咳疫苗。遵循时间表和推荐时间接种疫苗是保护孩子的最佳方式。

问：家人也应该接种疫苗吗？

家庭中最需要接种疫苗，且能给新生儿最大的保护的就是怀孕期间的母亲。其他家庭成员的疫苗接种不会为婴儿提供保护性抗体。然而，家庭成员接种疫苗可以保护他们自己，并最大限度地减少百日咳感染进入家庭的可能。

问：怀孕期间还建议接种哪些疫苗？

推荐孕期接种百日咳疫苗和COVID-19疫苗。这两种疫苗免费为孕妇提供。

在哪里可以获得更多信息？

请即刻向疫苗接种提供机构询问免费疫苗的情况。

联系您所在州或领地的卫生部：

ACT	02 5124 9800
SA	1300 232 272
NSW	1300 066 055
TAS	1800 671 738
NT	08 8922 8044
VIC	1300 882 008
WA	08 9321 1312
QLD	13 HEALTH (13 432 584)



health.gov.au/immunisation

截至2022年3月，本出版物中的所有信息均准确无误。
DT0002930



保护 婴儿 预防 百日咳。

孕期免费接种疫苗。



WHOOPIING COUGH
in young babies

请即刻咨询有关免费疫苗的信息。
health.gov.au/immunisation

什么是百日咳？

百日咳（又称疫咳）是一种具有高度传染性的细菌感染，通过感染者咳嗽或打喷嚏传播。百日咳会影响肺部和气管，可能导致剧烈且无法控制地咳嗽，致使呼吸困难。未接种疫苗的人患百日咳的风险很高。

百日咳有哪些症状？

- 百日咳一开始与感冒类似，伴有鼻塞或流鼻涕、打喷嚏、发烧和偶尔咳嗽。
- 咳嗽会加重，并会出现一阵阵强烈且止不住的咳嗽。
- 咳嗽发作后可能会出现呕吐、窒息或发出“哮喘”声。
- 有些新生儿根本不咳嗽，但会停止呼吸，脸色发青。



百日咳对婴儿来说可能很严重

- 百日咳会导致严重的并发症，包括脑损伤和肺炎，有时甚至会导致死亡。
- 6周以内的婴儿还太小，不能接种百日咳疫苗。
- 婴儿6个月大时才可完成百日咳接种的初次接种。



孕妇可以保护婴儿免患百日咳

- 保护婴儿免患百日咳最有效的方法就是在怀孕期间接种疫苗。
- 疫苗接种后可通过胎盘将保护性抗体传递给婴儿。为初生婴儿在最脆弱的头几个月提供保护。
- 怀孕期间接种疫苗非常有效，现已证明疫苗可将3个月以下婴儿患染百日咳疾病的几率减少90%以上。



疫苗接种时间

- 建议在孕期20周到32周之间接种一次疫苗。
- 百日咳疫苗可以安全地与流感和/或COVID-19疫苗同时接种。



在怀孕期间接种百日咳疫苗是安全的

- 研究表明，怀孕期间接种疫苗后，孕妇或发育中的胎儿出现死胎等并发症的风险没有增加。
- 接受百日咳疫苗的副作用通常是轻微的。一些常见的副作用包括注射疫苗部位的疼痛、皮肤红肿、肌肉疼痛或发烧。然而，这些副作用在孕妇中并不比在非孕期妇女中更常见。