

자주 묻는 질문

질문: 백일해 백신은 임신부들에게는 무료입니까?

그렇습니다. 국립 예방접종 프로그램을 통해 백신을 무료로 임신부들에게 제공합니다.

질문: 임신 중에 예방접종을 받았는데도 여전히 아기가 예방접종을 받아야 합니까?

그렇습니다. 국립 예방접종 프로그램의 유아 스케줄에 의하면 아기의 백일해 예방접종은 여전히 필요합니다. 이것은 2개월 (6주에 맞을 수도 있음), 4개월 그리고 6개월에 맞는 백일해 백신 접종을 포함합니다. 이 스케줄 및 권장 시기를 따르는 것이 아기 보호를 유지하는 최선의 길입니다.

질문: 가족이 예방접종을 받아야 합니까?

신생아에게 최상의 보호를 제공하기 위해서는 가족 중에 예방접종을 받아야 하는 가장 중요한 사람이 임신부입니다. 다른 가족 구성원이 예방접종을 받는 것이 아기에게 보호 항체를 제공하지는 않습니다. 그러나 가족 구성원이 예방접종을 받는 것은 그 가족 구성원을 보호할 수 있고 백일해 감염이 가정에 들어오는 기회를 최소화할 수 있습니다.

질문: 임신 중에 어떤 다른 예방접종이 권장되니까?

독감 (인플루엔자) 백신과 COVID-19 백신도 임신부들에게 권장되며 무료로 제공됩니다.

어디에서 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니까?

오늘 무료 백신에 대하여 예방접종 제공자에게 문의하십시오.

주정부 혹은 준주 보건부에 연락하십시오:

ACT	02 5124 9800
SA	1300 232 272
NSW	1300 066 055
TAS	1800 671 738
NT	08 8922 8044
VIC	1300 882 008
WA	08 9321 1312
QLD	13 HEALTH (13 432 584)



health.gov.au/immunisation

이 발행물의 모든 정보는 2022년 3월 현재 정확합니다.
DT0002930



WHOOPING COUGH
in young babies

오늘 무료 백신에 관하여 문의하십시오.
health.gov.au/immunisation

**아기를
백일해로부터
보호하십시오.**

임신했을 때 무료
예방접종을 받으십시오.



백일해는 무엇입니까?

백일해 (백일기침이라고도 함)는 감염된 사람이 기침이나 재채기를 할 때 퍼지는 감염성이 높은 박테리아 감염입니다. 백일해는 폐와 기도에 영향을 미치며 발작적이고 억제하기 힘든 기침을 일으켜서 호흡을 어렵게 만들 수 있습니다. 예방접종을 받지 않은 사람은 백일해에 걸릴 위험이 높습니다.

어떤 증상들이 있습니까?

- 백일해는 코막힘 혹은 콧물, 재채기, 열, 그리고 가끔씩 기침을 동반한 감기처럼 시작됩니다.
- 기침은 악화되고 조절이 안되며 한차례씩 심하게 터져 나오는 기침으로 발전합니다.
- 한차례의 기침은 구토 질식 혹은 '그러렁'하는 소리로 이어질 수 있습니다.
- 어떤 신생아는 기침은 전혀 하지 않지만 호흡이 멈추고 퍼래질 수가 있습니다.



백일해가 아기에게 심각해질 수도 있습니다

- 백일해는 뇌손상, 폐렴 및 때로는 사망을 포함한 심각한 합병증을 일으킬 수 있습니다.
- 6 주 미만의 아기들은 백일해 예방접종을 받기에는 너무 어렵습니다.
- 아기들은 6 개월이 되기 전까지는 백일해 예방을 위한 기본 예방접종 코스를 완료할 수 없습니다.



임신부가 아기를 백일해로부터 보호할 수 있습니다

- 어린 아기를 백일해로부터 보호하는 가장 효과적인 방법은 임신 중에 예방접종을 받는 것입니다.
- 예방접종을 받으면 보호 항체가 태반을 통해 태아에게 전달되어 가장 취약한 생후 첫 몇 개월 동안 아기를 보호해 줍니다.
- 임신 중 예방 접종은 매우 효과적입니다 - 예방접종이 3개월 미만 아기들에게서 90% 이상이 백일해의 감소를 보여줬습니다.



예방 접종 시기

- 임신 20 주에서 32 주 사이에 일회 용량을 접종 받도록 권장하고 있습니다.
- 백일해 백신은 독감 그리고/혹은 COVID-19 백신과 같은 날에 안전하게 주어질 수 있습니다.



임신 중 백일해 예방 접종은 안전합니다

- 임신 중에 예방 접종을 받은 후의 임신부나 자라는 아기에게 사산아와 같은 합병증 증가 위험이 없음이 연구에 의해 밝혀졌습니다.
- 백일해 예방 접종을 받은 후 생기는 부작용은 보통 경미합니다. 흔한 부작용은 접종 부위의 통증, 홍조, 붓기, 혹은 근육통이나 열이 포함됩니다. 그러나 이런 부작용들이 임신하지 않은 여성들보다 임신부들에게서 더 많이 나타나지는 않습니다.