



Australian Government



Vierte

COVID-19-Impfstoffdosis

08. Juli 2022

Der Winter bringt oft mehr Infektionen durch Atemwegsviren wie COVID-19 mit sich. Um den bestmöglichen Schutz gegen COVID-19 zu gewährleisten, wird eine zusätzliche Auffrischungsimpfung bzw. eine vierte COVID-19-Impfstoffdosis für Personen empfohlen, die ein höheres Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19 haben. Das ist die fünfte COVID-19-Impfstoffdosis für Personen, deren Immunsystem stark geschwächt ist.

Sie sollten eine vierte COVID-19-Impfdosis erhalten, wenn Sie:

- 50 Jahre oder älter sind
- in einem Senioren- oder Pflegeheim leben

Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung wird auch für Personen empfohlen, die 16 Jahre oder älter sind und

- immungeschwächt sind
- bestimmte Krebsarten haben oder überlebt haben
- an einer behandlungsbedürftigen Autoimmunerkrankung leiden
- eine chronische oder schwere Krankheit haben, die ihre Lunge, Leber, Nieren, ihr Gehirn oder Herz betrifft
- an Diabetes leiden, der eine medikamentöse Behandlung erfordert
- eine Behinderung mit erheblichen Gesundheitsbedürfnissen haben
- stark über- oder untergewichtig sind.

Personen im Alter von 30 bis 49 Jahren können auch eine vierte Dosis erhalten, wenn sie dies wünschen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie eine vierte Dosis erhalten sollten.

Sie können die vierte Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten, wenn seit Ihrer Auffrischungsdosis mindestens **3 Monate** vergangen sind.

Sie können Ihre COVID-19-Impfung gleichzeitig mit einer Grippeimpfung erhalten.

Wenn Sie kürzlich positiv auf COVID-19 getestet wurden, wird empfohlen, **3 Monate** zu warten, bevor Sie Ihre nächste COVID-19-Impfdosis erhalten.



Weitere Informationen finden Sie unter www.health.gov.au oder rufen Sie die National Coronavirus Helpline unter 1800 020 080 an. Wählen Sie Option 8 für kostenlose Dolmetscherdienste.