



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

แนะนำให้เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีบางคนรับการฉีดวัคซีน COVID-19

07 กันยายน 2022

ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันโรคของออสเตรเลีย Australian Technical Advisory Group on Immunisation แนะนำให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีบางคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง ความทุพพลภาพ และคนที่มีภาวะด้านสุขภาพซับซ้อนและ/หรือหลายอย่างซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง

ซึ่งรวมถึงเด็กที่มีภาวะหรือภาวะที่คล้ายคลึงกันต่อไปนี้:

- ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิหรือทุติยภูมิรุนแรง รวมถึงผู้ที่กำลังรับการรักษาโรคมะเร็งหรือรับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน
- การปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์หรือการบำบัดด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาว (CAR-T)
- โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ซับซ้อน
- ความผิดปกติของทางโครงสร้างของทางเดินหายใจหรือโรคปอดเรื้อรัง
- เบาหวานชนิดที่ 1
- โรคระบบประสาทหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงประสาทเรื้อรัง
- ความทุพพลภาพที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือบ่อยในการทำกิจกรรมของชีวิตประจำวัน เช่น ภาวะสมองพิการรุนแรงหรือดาวน์ ซินโดรม (Trisomy 21)

เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการป่วยหนักจากการติดเชื้อ COVID-19 การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จะช่วยลดความเสี่ยงนี้

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีที่ไม่อยู่ในรายการหมวดหมู่ที่มีสิทธิ์ มีความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อ COVID-19 ต่ำมากและไม่ได้รับการแนะนำให้รับวัคซีน COVID-19 ณ ขณะนี้

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีจะรับวัคซีนชนิดไหนได้?

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีที่มีสิทธิ์ได้รับแนะนำให้รับวัคซีน COVID-19 2 เข็มโดยให้ห่างกัน 8 สัปดาห์ เด็กบางคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรงอาจจำเป็นต้องฉีด 3 เข็ม เด็กในช่วงอายุนี้อาจสามารถรับวัคซีน Spikevax (Moderna) ได้

เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนชนิดไหน?

เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปทุกคนสามารถรับวัคซีน COVID-19 ได้แล้วตอนนี้

เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปอาจรับได้วัคซีน Moderna หรือ Pfizer COVID-19 ก็ได้ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ได้รับแนะนำให้รับวัคซีน COVID-19 2 เข็มซึ่งให้ห่างกัน 8 สัปดาห์ เด็กบางคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรงอาจจำเป็นต้องได้รับ 3 เข็ม

แต่แนะนำให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปรับวัคซีนยี่ห้อเดียวกันทั้งสองเข็ม

วัคซีน COVID-19 และวัคซีนอื่น ๆ

Australian Technical Advisory Group on Immunisation แนะนำว่า เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีควรรอ 7 ถึง 14 วันระหว่างวัคซีน COVID-19 และวัคซีนอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียง เช่น ไข้ ให้มีน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สามารถให้วัคซีน COVID-19 ในเวลาเดียวกันกับวัคซีนอื่น ๆ ได้ หากจะมีปัญหาเรื่องการให้ในเวลาแยกกัน เช่น การให้วัคซีนตามโครงการขยายผลไปยังพื้นที่ห่างไกล

หากบุตรของคุณเคยป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 มาแล้ว

บุตรของคุณควรรอ 3 เดือนหลังการตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ก่อนที่พวกเขาจะรับวัคซีน COVID-19 หากบุตรของคุณมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีน พวกเขาควรได้วัคซีน COVID-19 ที่กำหนดไว้ครั้งต่อไปโดยเร็ว หลัง 3 เดือนนั้น บุตรของคุณยังคงควรได้รับวัคซีนทุกเข็มที่แนะนำสำหรับพวกเขาด้วย

ฉันสามารถจองนัดให้บุตรของฉันรับวัคซีนได้เมื่อใด?

ขณะนี้เปิดให้จองแล้วสำหรับเด็กที่มีสิทธิ์ในกลุ่มอายุนี้นี้ ผ่านทางเครื่องมือค้นหาคลินิกวัคซีน: <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/>

โปรดเช็คกลับอย่างสม่ำเสมอเพราะผู้ให้ภูมิคุ้มกันโรคจะยังคงเพิ่มการนัดใหม่ ๆ ขึ้นอยู่ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.health.gov.au
หรือโทรถึงสายให้ความช่วยเหลือโคโรนาไวรัสแห่งชาติ (National Coronavirus helpline)
ที่หมายเลข 1800 020 080 กด 8 สำหรับบริการล่ามฟรี