



COVID-19 VACCINATION

واکسیناسیون COVID-19 برای بعضی از کودکان 6 ماهه تا 4 ساله توصیه می شود

7 سپتامبر 2022

کارشناسان ایمن سازی استرالیا، Australian Technical Advisory Group on Immunisation، واکسیناسیون COVID-19 را برای کودکان 6 ماهه تا 4 ساله دارای نقص ایمنی شدید، معلولیت، و کسانی که دارای شرایط بهداشتی پیچیده و/یا چندگانه هستند که خطر COVID-19 شدید را افزایش می دهد، توصیه می کنند.

اینها شامل کودکانی با شرایط زیر یا مشابه آنها هستند:

- نقص ایمنی اولیه یا ثانویه شدید، از جمله مواردی که تحت درمان برای سرطان هستند یا تحت درمان های سرکوبی سیستم ایمنی قرار دارند؛
- پیوند مغز استخوان یا سلول های بنیادی، یا درمان با سلول های تی (T-cell) آنتی ژن کایمیریک (CAR-T)؛
- بیماری قلبی مادرزادی پیچیده؛
- ناهنجاری های ساختاری مجرای هوایی یا بیماری مزمن ریوی؛
- دیابت قندی نوع 1؛
- شرایط مزمن عصبی یا عصبی عضلانی؛ یا
- معلولیتی مانند فلج مغزی شدید یا سندرم داون (تریزومی 21) که نیاز به کمک مکرر در مورد فعالیت های روزمره زندگی دارد.

این کودکان خطر افزایش یافته ای از بیماری شدید ناشی از COVID-19 را دارند. واکسیناسیون علیه COVID-19 به کاهش این خطر کمک خواهد کرد.

کودکان 6 ماهه تا 4 ساله که در دسته های واجد شرایط ذکر نشده اند، در معرض خطر خیلی پایینی از بیماری شدید ناشی از COVID-19 هستند. در حال حاضر توصیه نمی شود که آنها واکسن COVID-19 را دریافت کنند.

کودکان 6 ماهه تا 4 ساله کدام واکسن را دریافت خواهند کرد؟

توصیه می شود که به کودکان 6 ماهه تا 4 ساله واجد شرایط 2 دوز از واکسن COVID-19 را با فاصله 8 هفته از هم داده شود. بعضی از کودکان دارای نقص ایمنی شدید ممکن است به 3 دوز نیاز داشته باشند. کودکان در این محدوده سنی می توانند واکسن Spikevax (Moderna) را دریافت کنند.

کودکان 5 ساله و بزرگتر چه واکسن هایی را می توانند دریافت کنند؟

همه کودکان 5 ساله و بزرگتر می توانند واکسن COVID-19 را دریافت کنند.

کودکان 5 ساله و بزرگتر ممکن است واکسن COVID-19 Moderna یا Pfizer را دریافت کنند. به کودکان 5 ساله و بالاتر توصیه می شود که 2 دوز واکسن COVID-19 را با فاصله 8 هفته دریافت کنند. بعضی از کودکان دارای نقص ایمنی شدید ممکن است به 3 دوز نیاز داشته باشند.

ترجیح داده می شود که کودکان 5 ساله و بزرگتر از واکسن های مارک مشابه برای هر دو دوز استفاده کنند.

واکسن های COVID-19 و واکسن های دیگر

Australian Technical Advisory Group on Immunisation توصیه می کند که کودکان 6 ماهه تا 4 ساله باید بین 7 تا 14 روز بین واکسن COVID-19 و واکسن های دیگر صبر کنند تا خطر عوارض جانبی مانند تب را به حداقل برسانند. با این حال، واکسن COVID-19 را می توان همزمان با واکسن های دیگر تزریق کرد، اگر تزریق آنها در زمان های جداگانه دشوار باشد، مانند برنامه های کمک رسانی به مناطق دورافتاده.

اگر فرزند شما COVID-19 داشته است

فرزند شما باید 3 ماه پس از مثبت شدن آزمایش COVID-19 صبر کند تا واکسن COVID-19 را دریافت کند. اگر فرزند شما واجد شرایط واکسیناسیون باشد، واکسیناسیون برنامه ریزی شده بعدی COVID-19 باید در اسرع وقت پس از 3 ماه انجام شود. فرزند شما هنوز باید تمام دوزهای توصیه شده برای وی را دریافت کند.

من چه زمانی می توانم برای دریافت واکسن برای فرزندم وقت بگیرم؟

اکنون رزرو کردن برای کودکان واجد شرایط در این گروه سنی از طریق درمانگاه واکسن یاب باز است:
<https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/>

به طور مرتب چک کنید، چون ارائه دهنده ایمن سازی وقت های آنرا مرتب اضافه می کنند.

اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر به www.health.gov.au مراجعه کنید یا با National Coronavirus Helpline به شماره 1800 020 080 تماس بگیرید. برای خدمات ترجمه شفاهی رایگان، گزینه 8 را فشار دهید.

