



Australian Government



Chanjo ya COVID-19 inapendekezwa kwa watoto wengine wa umri wa miezi 6 hadi miaka 4

7 Septemba 2022

Wataalamu wa chanjo wa Australia, Australian Technical Advisory Group on Immunisation, hupendekeza chanjo ya COVID-19 kwa watoto wa umri wa miezi 6 hadi miaka 4 wenye kingamwili dhaifu sana, ulemavu, na wale ambao wana hali ngumu na/au nyingi za afya zinazoongeza hatari yao ya kuugua COVID-19 mbaya.

Hawa wanajumuisha watoto wenye hali zifuatazo au sawa:

- Upungufu mkubwa wa kingamwili wa msingi au sekondari, ikiwa ni pamoja na wale wanaopata matibabu ya saratani, au matibabu ya kukandamiza kinga;
- Upandikizaji wa uboho wa mifupa au wa seli ya shina, au tiba ya antijeni ya T-seli ya chimeric (CAR-T);
- Ugonjwa wa moyo wa kuzaliwa ngumu;
- Ukiukwaji wa muundo wa njia ya hewa au ugonjwa sugu wa mapafu;
- Aina 1 ya kisukari mellitus;
- Hali za muda mrefu ya neva au ya misuli ya neva; au
- Ulemavu unaotakiwa usaidizi wa mara kwa mara wa shughuli za maisha ya kila siku, kama vile ugonjwa mkubwa wa kupooza kwa ubongo au Ugonjwa wa Down (Trisomy 21).

Watoto hawa wana hatari kubwa ya kuugua sana kutokana na COVID-19. Chanjo dhidi ya COVID-19 itasaidia kupunguza hatari hii.

Watoto wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 4 ambao hawajaorodheshwa katika kategoria za kustahiki wana hatari ndogo sana ya kupata ugonjwa mbaya kutoka kwa COVID-19.

Hawapendekezwi kupokea chanjo ya COVID-19 kwa wakati huu.

Je! watoto wa miezi 6 hadi miaka 4 watapata chanjo gani?

Watoto wanaostahili wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 4 wanapendekezwa kupata dozi 2 za chanjo ya COVID-19, wakipewa wiki 8 tofauti. Baadhi ya watoto walio na upungufu mkubwa wa kinga wanaweza kuhitaji dozi 3. Watoto wa umri huu wanaweza kupokea chanjo ya Spikevax (Moderna).

Je! ni chanjo gani ambazo watoto wenye umri wa miaka 5 na zaidi wanaweza kupokea?

Watoto wote wa umri wa miaka 5 na zaidi wanaweza kupata chanjo ya COVID-19 sasa.

Watoto wenye umri wa miaka 5 na zaidi wanaweza kupokea ama chanjo ya COVID-19 ya Moderna au Pfizer. Watoto wenye miaka 5 na zaidi hupendekezwa kupata vipimo 2 vya chanjo ya COVID-19, kupewa wiki 8 tofauti. Baadhi ya watoto walio na upungufu mkubwa wa kinga wanaweza kuhitaji vipimo 3.

Inapendelewa kuwa watoto wenye umri wa miaka 5 na zaidi wawe na chapa sawa ya chanjo kwa dozi zote mbili.

Chanjo za COVID-19 na chanjo zingine

Australian Technical Advisory Group on Immunisation hupendekeza kuwa watoto wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 4 wanapaswa kusubiri siku 7 hadi 14 kati ya chanjo yao ya COVID-19 na chanjo nyingine ili kupunguza hatari ya athari kama vile homa. Hata hivyo, chanjo ile ya COVID-19 inaweza kutolewa kwa wakati mmoja kama chanjo nyingine ikiwa itakuwa changamoto kutoa kwa nyakati tofauti, kama vile programu za kufikia maeneo ya mbali.

Ikiwa mtoto wako alikuwa ameugua COVID-19

Mtoto wako anapaswa kusubiri miezi 3 baada ya kupimwa chanjo ana COVID-19 kabla ya kupata chanjo ya COVID-19. Ikiwa mtoto wako anastahili kupata chanjo, chanjo iliyoratibiwa ijayo ya COVID-19 inapaswa kupewa haraka iwezekanavyo baada ya miezi 3. Mtoto wako bado anapaswa kuwa na dozi zote zinazopendekezwa kwake.

Je, ni lini ninaweza kuweka miadi ili mtoto wangu apokee chanjo?

Nafasi sasa zimefunguliwa kwa watoto wanaostahili chanjo katika kikundi hiki cha umri kupitia Kitafuta Kliniki ya Chanjo: <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/>

Angalia tena mara kwa mara, kwa sababu watoa chanjo wataendelea kuongeza miadi mipya.

Maelezo zaidi



Kwa habari zaidi tembelea kwenye www.health.gov.au au piga simu National Coronavirus Helpline kwenye 1800 020 080. Bonyeza chaguo la 8 kwa huduma za ukalimani za bure.