



Australian Government



Вакцинация против COVID-19 рекомендуется для некоторых детей в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет

07 сентября 2022 г.

Австралийские эксперты по иммунизации - Australian Technical Advisory Group on Immunisation, рекомендуют вакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет с тяжелым иммунодефицитом, инвалидностью, а также для детей со сложными и/или множественными заболеваниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19.

К ним относятся дети с нижеперечисленными или подобными состояниями:

- Тяжелый первичный или вторичный иммунодефицит, в том числе у пациентов, проходящих лечение от рака или принимающих иммунодепрессанты;
- Трансплантация костного мозга или стволовых клеток или терапия химерным антигеном Т-клеток (CAR-T);
- Сложный врожденный порок сердца;
- Структурные аномалии дыхательных путей или хронические заболевания легких;
- Сахарный диабет 1 типа;
- Хронические неврологические или нервно-мышечные заболевания; или же
- Инвалидность, которая требует частой помощи в повседневной жизни, например, тяжелый церебральный паралич или синдром Дауна (трисомия 21).

У таких детей повышен риск серьезного заболевания от COVID-19. Вакцинация против COVID-19 поможет снизить этот риск.

У детей в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет, не упомянутых в категориях, имеющих право на вакцинацию, риск развития тяжелого заболевания от COVID-19 очень невелик. В настоящее время им **не рекомендуется** делать прививку от COVID-19.

Какую вакцину получат дети в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет?

Детям в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет, которые соответствуют критериям, рекомендуется получить 2 дозы вакцины против COVID-19 с интервалом в 8 недель. Некоторым детям с тяжелым иммунодефицитом может потребоваться 3 дозы. Дети этого возрастного диапазона могут получить вакцину Spikevax (Moderna).

Какие прививки можно делать детям в возрасте 5-ти лет и старше?

Все дети в возрасте 5-ти лет и старше теперь могут пройти вакцинацию против COVID-19.

Дети в возрасте 5 лет и старше могут вакцинироваться против COVID-19 вакцинами Moderna или Pfizer. Детям в возрасте 5 лет и старше рекомендуется получить 2 дозы вакцины против COVID-19 с интервалом в 8 недель. Некоторым детям с тяжелым иммунодефицитом может потребоваться 3 дозы.

Желательно, чтобы дети в возрасте 5-ти лет и старше для обеих доз получали вакцины одной и той же марки.

Вакцины против COVID-19 и другие вакцины

Australian Technical Advisory Group on Immunisation рекомендует детям в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет делать перерыв между прививками от COVID-19 и другими вакцинами от 7 до 14 дней, чтобы свести к минимуму риск побочных эффектов, таких как повышение температуры. Тем не менее, вакцину против COVID-19 можно вводить одновременно с другими вакцинами, если вводить их в разное время затруднительно, например, в рамках выездных программ в отдаленных районах.

Если ваш ребенок переболел COVID-19

После положительного результата теста на COVID-19 вашему ребенку следует подождать 3 месяца, прежде чем проходить вакцинацию против COVID-19. Если ваш ребенок имеет право на вакцинацию, следующую запланированную вакцинацию против COVID-19 следует сделать как можно скорее по истечении 3 месяцев. Вашему ребенку по-прежнему следует вакцинироваться всеми дозами, рекомендованными для него/нее.

Когда я могу записаться на прием для вакцинации моего ребенка?

В настоящее время открыта запись на вакцинацию для соответствующих критериям детей в этой возрастной группе через систему поиска клиник вакцинации:

<https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/>

Регулярно проверяйте наличие мест, так как поставщики услуг вакцинации будут продолжать добавлять доступное время приемов.

Дополнительная информация.



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.health.gov.au или позвоните в National Coronavirus Helpline по телефону 1800 020 080. Нажмите 8, если вам требуются услуги бесплатного переводчика.