



Australian Government



Вакцинація проти COVID-19 рекомендується для деяких дітей віком від 6 місяців до 4 років

7 вересня 2022 р.

Австралійські експерти з імунізації, Australian Technical Advisory Group on Immunisation, рекомендують вакцинацію проти COVID-19 дітям віком від 6 місяців до 4 років з тяжкою формою імунodefіциту, інвалідністю, а також тим, хто має складні та/або множинні захворювання, що підвищують ризик розвитку тяжкої форми COVID-19.

Сюди входять діти з наступними або подібними захворюваннями:

- Тяжка форма первинного або вторинного імунodefіциту, включаючи тих, хто проходить лікування від раку або приймає імуносупресивні препарати;
- Трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, або терапія химерними антигенними Т-клітинами (CAR-T);
- Комплексні уроджені захворювання серця;
- Структурні аномалії дихальних шляхів чи хронічні захворювання легень;
- Цукровий діабет 1-го типу;
- Хронічні неврологічні чи нервово-м'язові захворювання; або
- Інвалідність, яка потребує частої допомоги у повсякденному житті, наприклад, тяжкий церебральний параліч або синдром Дауна (трисомія 21).

Такі діти мають підвищений ризик важкої форми захворювання на COVID-19. Вакцинація проти COVID-19 допоможе зменшити цей ризик.

Діти віком від 6 місяців до 4 років, які не входять до списку відповідних категорій, мають дуже низький ризик розвитку важкої форми захворювання від COVID-19. Наразі їм **не** рекомендується отримувати вакцину проти COVID-19.

Яку вакцину будуть отримувати діти віком від 6 місяців до 4 років?

Дітям віком від 6 місяців до 4 років рекомендується ввести 2 дози вакцини проти COVID-19 з різницею у 8 тижнів, якщо вони мають на це право. Деяким дітям з тяжкою формою імунодефіциту може знадобитися 3 дози. Діти у цьому віковому діапазоні можуть отримувати вакцину Spikevax (Moderna).

Які вакцини можна отримувати дітям віком від 5 років та старше?

Усі діти віком від 5 років та старше можуть отримати вакцину проти COVID-19 вже зараз.

Діти віком від 5 років і старше можуть отримувати вакцину Moderna або Comirnaty (Pfizer) проти COVID-19. Дітям старше 5 років рекомендується отримати 2 дози вакцини проти COVID-19 з інтервалом у 8 тижнів. Деяким дітям з тяжкою формою імунодефіциту може знадобитися 3 дози.

Бажано, щоб у дітей віком від 5 років і старше обидві дози вакцин були однієї й тієї ж марки.

Вакцини проти COVID-19 та інші вакцини

Australian Technical Advisory Group on Immunisation рекомендує дітям від 6 місяців до 4 років витримувати інтервал від 7 до 14 днів між вакциною проти COVID-19 та іншими вакцинами, щоб мінімізувати ризик побічних ефектів, таких як висока температура. Однак вакцину проти COVID-19 можна вводити одночасно з іншими вакцинами, якщо вводити їх у різний час проблематично, наприклад, у рамках програм роботи з населенням у віддалених районах.

Якщо у вашої дитини був COVID-19

Ваша дитина повинна почекати 3 місяці після позитивного результату тесту на COVID-19, перш ніж їй буде зроблено щеплення проти COVID-19. Якщо ваша дитина має право на вакцинацію, наступна планова вакцинація проти COVID-19 повинна бути проведена якнайшвидше після 3 місяців. Ваша дитина, як і раніше, повинна отримувати всі рекомендовані їй дози.

Коли я можу записати на вакцинацію мою дитину?

Ви можете записатися на вакцинацію проти COVID-19 скориставшись Vaccine Clinic Finder <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>

Регулярно перевіряйте наявність місць на вакцинацію, оскільки постачальники послуг з вакцинації продовжують додавати нові місця.

Додаткова інформація



Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням www.health.gov.au або зателефонуйте до National Coronavirus Helpline за номером 1800 020 080. Натисніть 8, щоб отримати безкоштовні послуги усного перекладу.