



Australian Government



# COVID-19 එන්නත වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 6 දක්වා ළමුන් හට නිර්දේශ කරයි

2022 සැප්තැම්බර් 07

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජර්නියානු විශේෂඥයන් වන Australian Technical Advisory Group on Immunisation මගින් වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර දරුණු ලෙස ජර්නියානු ජීවනවේදී, ආබාධිත, සහ දරුණු ලෙස COVID-19 ආසාදනයේ අවධානම වැඩි කරන සංකීර්ණ සහ/හෝ රෝගී තත්වයන් ගණනාවක් ඇති අය හට COVID-19 එන්නත නිර්දේශ කරයි.

මේ ළමුන් අතර පහත හෝ සමාන රෝගී තත්වයන් ඇති අයද ඇතුළත්වේ:

- පිළිකාවලට ජර්නියානු ලබා ගන්නා අය, හෝ ජර්නියානු ජීවනවේදී ජර්නියානු ගන්නා අය ඇතුළුව දරුණු ජරාලමික හෝ ද්විතීයික ජර්නියානු ජීවන වේදී;
- බෝන් මැරෝ හෝ සිටෙම් සයිල බද්ධය, හෝ විමෙරික් අන්ටිජන් ටී-සෙල් (CAR-T) ජර්නියානු
- සංකීර්ණ කොන්ජේනිටල් කාඩියැක් රෝගය;
- වායු මාර්ගයේ වියුහාත්මක වෙනස්කම් හෝ ක්ලොනික් පෙනහළු රෝග;
- ටයිප් 1 ඩයබීටිස් මෙලයිටුස්;
- ක්ලොනික් ස්නායු හෝ ස්නායු පේශි රෝගී තත්වයන්
- දරුණු සෙරිබරල් පෝලියෝ හෝ ඩවුන්ස් සින්ඩ්‍රෝමය (ටීර්සොම් 21) ආදී දිනපතා ජීවිතයට අවශ්‍ය ක්ලොනික්වලට නිතර උපකාර අවශ්‍ය වන ආබාධයක්.

මෙම දරුවන් හට COVID-19 ආසාදනය හේතුවෙන් ඉතාම දරුණු ලෙසට රෝගීවීමේ වැඩිපුර අවධානමක් ඇත. COVID-19 ආසාදනයට එරෙහිව එන්නත් කිරීම මගින් අවධානම අඩුකර ගත හැකිය.

සුදුසුකම් ලබන කණ්ඩායම්වලට ඇතුළත් කර නැති වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර ළමුන් හට COVID-19 ආසාදනය හේතුවෙන් දරුණු ලෙස අසනීපවීමේ අවධානම ඉතා අඩුය. මෙම අවස්ථාවේදී ඔවුන් හට COVID-19 එන්නත් ලබා ගැනීම නිර්දේශ නොකරයි.

**වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර ළමුන් විසින් ලබාගත යුතු එන්නත කුමක්ද?**

වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර සුදුසුකම් ලබන ළමුන් හට සති 8 ක කාල පරතරයක් ඇතිව COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 2 ක් ලබාදීම නිර්දේශ කරයි. දරුණු ලෙස ප්රතිශක්තිකරණය හීනවූ සමහර ළමුන් විසින් මාත්‍රා 3 ක් ලබා ගැනීම අවශ්ය විය හැකිය. මෙම වයස් පරාසයේ දරුවන් හට Spikevax (Moderna) එන්නත ලබාගත හැකිය.

**වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් විසින් කුමන එන්නත ලබාගත හැකිද?**

වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් විසින් දැන් COVID-19 එන්නත ලබාගත හැකිය.

වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් විසින් COVID-19 Moderna හෝ Pfizer එන්නත් ලබාගත හැකිය. වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් සඳහා සති 8 ක කාල පරතරයක් ඇතිව COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 2 ක් ලබාදීම නිර්දේශ කරයි. දරුණු ලෙස ප්‍රතිශක්තිකරණය හීනවූ අය හට මාත්‍රා 3 ක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් හට එන්නත් මාත්‍රා කෙ සඳහාම එකම වෙළඳ නාමය භාවිතා කිරීම වඩා යෝග්‍යවේ.

**COVID-19 එන්නත සහ වෙනත් එන්නත්**

Australian Technical Advisory Group on Immunisation මගින් නිර්දේශ කරන්නේ වයස මාස 6 සහ අවුරුදු 6 අතර ළමුන් විසින් උණ වැනි අතුරු ආබාධවලින් ඇතිවිය හැකි අවධානම අවම කර ගැනීම සඳහා COVID-19 එන්නත සහ අනෙක් එන්නත් අතර දින 7 සිට 14 කාලයක් බලා සිටිය යුතු බවයි. කෙසේවුවද, දුරස්ථ ප්රදේශවල සිටින අවුට්රීච් වැඩසටහන වැනි වෙනමම අවස්ථාවල එන්නත ලබාදීම අභියෝගාත්මක අවස්ථාවල COVID-19 එන්නත අනෙක් එන්නත් සමඟ එකට ලබා දිය හැකිය.

**ඔබගේ දරුවාට COVID-19 ආසාදනය වැළැද්දී නම්**

ඔබගේ දරුවාට COVID-19 ආසාදනය ඇති බවට පරීක්ෂණයකින් සනාථ වූණු පසු COVID-19 එන්නත ලබාදීමට පෙර මාස 3 ක් බලා සිටිය යුතුය. ඔබගේ දරුවා හට එන්නත ලබා ගැනීමට සුදුසුනම්, මිලඟ නියමිත COVID-19 එන්නත මාස 3 කට පසු හැකි විගස ලබා දිය යුතුය. ඔබගේ දරුවා විසින් සියළුම නිර්දේශ කල මාත්‍රා ලබා ගත යුතුය.

**මාගේ දරුවා හට එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා දිනයක් නියම කර ගන්නේ කෙසේද?**

මෙම වයස් කාණ්ඩයේ ළමුන් හට දැන් එන්නත් සායන සොයනය ඔස්සේ දින වෙන්කර ගැනීම සිදුකල හැකිය: <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/>

එන්නත් සපයන්නන් විසින් නව හමුවීමේ ස්ථාන දිගටම එක් කරන බැවින් නීතිපතා සෝදිසි කරන්න.

## වැඩිදුර විස්තර



වැඩිදුර විස්තර සඳහා [www.health.gov.au](http://www.health.gov.au) වෙත පිවිසෙන්න, නැතිනම් දුරකථන අංක 1800 020 080 ඔස්සේ ජාතික කොරෝනා වසිරස් උපකාරක අංකය අමතන්න. නොමිලේ පරිවර්තන සේවා සඳහා 8 වන විකල්පය තෝරා ගන්න.